



**Attivatore delle autodifese delle piante
Regolatore di crescita per kiwi e uva da tavola.**

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione del Sitifex®:

Sostanza attiva:

Forchlorfenuron 0,92 % p/p (7,5g/l)

Coformulanti:

q.b. 100 / Contiene etanolo

UN 1170

Etanolo in soluzione
(alcol etilico in soluzione)

Avvertenze di pericolo:

Liquido e vapori facilmente infiammabili. -
Provoca irritazione cutanea. - Provoca grave
irritazione oculare. - Nocivo per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata. - Per
evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente
seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza:

Tenere fuori dalla portata dei bambini;

Prevenzione: Tenere lontano da fonti di calore,
superfici calde, scintille, fiamme e altre fonti di
innesco. Vietato fumare - Tenere il recipiente
ben chiuso - Lavare accuratamente mani e viso
dopo l'uso - Non disperdere nell'ambiente -
Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere
gli occhi/proteggere il viso; **Reazioni:** IN CASO

DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare
abbondantemente con acqua e sapone - IN
CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciacquare - In caso
di irritazione della pelle: consultare un medico. -
Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare
un medico; **Conservazione:** Conservare in
luogo ben ventilato - Tenere in luogo fresco -
Conservare sottochiave; **Smaltimento:**
Smaltire il contenuto/recipiente in conformità
alla regolamentazione locale/regionale/
nazionale/internazionale.

Titolare della registrazione: Alzchem Trostberg GmbH

Stabilimento di produzione: Alzchem Trostberg GmbH

Dr.-Albert-Frank-Str. 32 D - 83308 Trostberg, Germania

www.alzchem.com

Rappresentata in Italia da: AGRIGIESSE srl

Sede amministrativa: Lungarno Gambacorti, 55, 56125 Pisa

Sede operativa: Viale J.F. Kennedy, 86, 70124 Bari

Tel.: 080/5277437 - E-mail: giovanni.papa@alzchem.com

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12828 del 02.10.2006

Contenuto netto: 1 Litro/ 500 ml/ 250 ml

Partita nr.:

Scadenza:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI : Indossare guanti di protezione
chimica e tuta intera da lavoro durante le fasi di miscelazione, carica
ed applicazione del prodotto. In caso di irrorazione del trattore, gli
specifici guanti di protezione chimica saranno utilizzati solo per la
manipolazione dell'attrezzatura di applicazione o per le superfici
contaminate. Inoltre, durante la pulizia e la movimentazione
dell'attrezzatura, devono essere utilizzatigli stessi DPI previsti per le
fasi di miscelazione/caricamento Prima di accedere all'area trattata è
opportuno attendere che lavegetazione sia completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di
sicurezza non trattata di 3 m da corpi idrici superficiali.

ISTRUZIONI DI PRONTO SOCCORSO

Contaminazione: Interrompere il lavoro e togliersi immediatamente gli
indumenti contaminati. Lavare le parti corporee esposte. In caso di
malore consultare un medico. Inalazione: Respirare aria fresca. In casi
gravi consultare un medico. Contatto con la pelle: Togliersi

immediatamente gli indumenti contaminati. Lavarsi immediatamente con
sapone e abbondante acqua. Contatto con gli occhi: Tenere gli occhi
aperti e sciacquare accuratamente. Ingerimento: Sciacquare la bocca.
Bere 1 - 2 bicchieri di acqua. Consultare un medico e richiedere, se
necessario, assistenza medica immediatamente. Non indurre il vomito.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 50 giorni prima della raccolta.

Per il periodo applicativo seguire attentamente le indicazioni di tecnica
applicativa specifica.

® marchio registrato
della AlzChem Trostberg GmbH
Germania



Caratteristiche

Attivatore delle autodifese delle piante di actinidia per il
contenimento dei sintomi del PSA*. Regolatore di crescita
per incrementare il calibro dei suoi frutti di actinidia e per l'uva
da tavola per incrementare la dimensione degli acini.

Indicazioni d'uso

Applicare il prodotto avendo cura di bagnare in maniera uniforme le
foglie, i frutti / grappoli (dimensione delle gocce 100-200 µm). Evitare
il trattamento nelle ore più calde. Evitare l'applicazione con pericolo
di pioggia imminente. Non miscelare il Sitifex® con altri prodotti.
Evitare ruscellamento e gocciolamento sulle parti trattate.

PSA - Applicazione su actinidia		
2 trattamenti in prefioritura		
1° trattamento:	Periodo:	3 - 5 foglie / germoglio
	Dosaggio:	Sitifex® 0,6 lt/ettaro
2° trattamento:	Periodo:	3 settimane dopo
	Dosaggio:	Sitifex® 0,7 lt/ettaro
Per ciascun trattamento:	Bagnare bene tutte le parti verdi delle piante (miscela 800 - 1.000 lt/ha)	
Il prodotto può essere applicato su <i>Actinidia chinensis</i> e <i>deliciosa</i> . Non applicare sulla varietà Soreli - Effettuare il 2° trattamento non oltre 10 gg prima dell'inizio della fioritura - Per le varietà di nuova introduzione, consultare il servizio tecnico.		
CALIBRO - Applicazione su actinidia		
1 trattamento in postfioritura		
Periodo applicativo:	circa 3 settimane dopo la piena fioritura (frutti a dimensione nocce)	
Dosaggio di Sitifex® per ettaro:		
Applicazione generalizzata (atomizzatore)		
Sitifex® (lt/ettaro)	Miscela (lt/ettaro)	Concentrazione p.a. (ppm)
1,0 - 1,3	1.000	7,5 - 9,75
0,8 - 1,0	750	8,0 - 10,0
Applicazione localizzata (lancia o atomizzatori speciali)		
Sitifex® (lt/ettaro)	Miscela (lt/ettaro)	Concentrazione p.a. (ppm)
0,6 - 0,8	600	7,5 - 10,0
0,4 - 0,5	400	7,5 - 9,40
Il Sitifex® deve essere utilizzato esclusivamente per una sola finalità, cioè o contro il PSA oppure per l'incremento del calibro. Il dosaggio massimo di Sitifex® per anno è di 1,3 litri / ettaro.		
Per l'incremento del calibro:		
Al fine di ottenere il massimo risultato è importante adeguare il carico dei frutti, la nutrizione e l'irrigazione delle piante. Applicare il Sitifex® esclusivamente su frutti bene impollinati.		
Applicazione su uva da tavola		
Periodo applicativo:	Varietà Italia	acini 10 - 12 mm
	Tutte le altre varietà:	acini 6 - 8 mm
Dosaggio di Sitifex® per ettaro:		
Sitifex® (lt/ettaro)		Miscela (lt/ettaro)
1,0 - 1,3		1.000
0,7 - 1,0		750
Per evitare l'accentuarsi dell'indesiderato fenomeno dell'acinellatura, effettuare il trattamento non prima della completa cascola naturale degli acini non allegati. Prima di trattare con il Sitifex®, se necessario, ridurre il numero di acini/grappolo ed adeguare la nutrizione e l'irrigazione delle piante. L'applicazione del prodotto su uva da tavola può indurre leggeri ritardi di colorazione e/o di maturazione del grappolo.		

ALTRE INDICAZIONI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE

- da non vendersi sfuso;
- da non applicare con mezzi aerei;
- non operare contro vento;

-
- il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente;
 - il contenitore non può essere riutilizzato;
 - smaltire le confezioni secondo le norme vigenti;
 - non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua;
 - non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per l'utilizzo su actinidia in prefioritura per il controllo PSA l'etichetta è valida dall'8 marzo 2024 al 5 luglio 2024.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale dell'8 marzo 2024.