

PIXXARO™

Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento tenero e duro, avena vernina, farro, orzo, segale, triticale, olivo e agrumi, vivai di specie arboree ornamentali, aree incolte, tappeti erbosi ad uso ornamentale e/o sportivo

CONCENTRATO EMULSIONABILE

**Meccanismi d'azione: Gruppo HRAC/WSSA 4
(già gruppo HRAC O)**

Composizione di PIXXARO

Halauxifen-metile (nome commerciale ARYLEX™ active) puro 1,21 g (12,508 g/l pari a 12 g/l di acido equivalente)

Fluroxipir-mepitil puro 38,94 g (403,458 g/l pari a 280 g/l di acido equivalente)

Cloquintocet-mexyl puro (antidoto agronomico) 1,16 g (pari a 12 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

Contiene: Cloquintocet-mexyl (CAS: 99607-70-2). Calcio dodecilbenzensolfonato (CAS 26264-06-2) in 2-etilesanolo (CAS 104-76-7). Miscela di dimetilammide di acidi grassi, C10 (CAS 14433-76-2) e dimetilammide di acido grasso, C8 (CAS 1118-92-9).



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. **H319:** Provoca grave irritazione oculare. **H335:** Può irritare le vie respiratorie. **H410:** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401:** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P261:** Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. **P270:** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P280:** Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. **P273:** Non disperdere nell'ambiente. **P302+352:** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P305+351+338:** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P333+ P337+P313:** In caso di irritazione o eruzione della pelle o se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. **P362+364:** Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. **P391:** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501:** Smaltire il contenuto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Corteva Agriscience Italia s.r.l. – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona
Tel. +39 0372 709900

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

Corteva Agriscience Italia s.r.l. – Mozzanica (BG) – Italia

Corteva Agriscience France S.A.S. – Drusenheim – Francia

DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) – Italia

Sinteco Logistics SpA – S. Giuliano Milanese (MI) (solo ri-etichettatura)

Arco Logistica S.r.l - Ferrara (FE) – Italia (solo ri-etichettatura)

Taglie autorizzate: 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 litri

Registrazione n. 16771 del 30/07/2018 del Ministero della Salute

Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

SPe1: per proteggere gli organismi del suolo, su olivo, agrumi, vivai di specie arboree ornamentali, aree incolte, tappeti erbosi ad uso ornamentale e/o sportivo, non applicare su più del 50% della superficie coltivata.

SPe3: per proteggere le piante terrestri non bersaglio applicare le seguenti misure nei confronti della vegetazione naturale:

– **Cereali autunno-vernini e primaverili ed avena vernina:** mantenere una fascia di rispetto non trattata di 5 m;

– **Olivo, agrumi, vivai di specie arboree ornamentali, aree incolte, tappeti erbosi ad uso ornamentale e/o sportivo:** mantenere una fascia di rispetto non trattata di 5 m.

SPe3: per proteggere gli organismi acquatici applicare le seguenti misure nei confronti dei corpi idrici superficiali:

– **Cereali autunno-vernini:** mantenere una fascia di rispetto non trattata di 5 m.

– **Olivo, agrumi, vivai di specie arboree ornamentali, aree incolte, tappeti erbosi ad uso ornamentale e/o sportivo:** mantenere una fascia di rispetto non trattata di 5 m.

SPe8: pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Inalazione: Trasportare la persona all'aria aperta. In caso di arresto respiratorio chiamare i servizi di emergenza o un'ambulanza, poi praticare la respirazione artificiale; per praticare la respirazione bocca a bocca, il soccorritore deve utilizzare un'adeguata protezione (ad es. una maschera tascabile). **Contatto con la pelle:** Togliere gli abiti contaminati. Lavare la pelle con sapone e molta acqua per 15 -20 minuti. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Scarpe ed altri articoli in pelle che non possono essere decontaminati devono essere smaltiti in modo adeguato. **Contatto con gli occhi:** Tenere gli occhi aperti e sciacquare lentamente e delicatamente con acqua per 15-20 minuti. Togliere lenti a contatto, se presenti, dopo i primi cinque minuti e continuare a sciacquare gli occhi.

Ingestione: Chiamare subito un centro antiveleni o un medico per indicazioni sul trattamento. Far sorvegliare un bicchiere d'acqua se la persona è capace di inghiottire. Non indurre il vomito a meno che non sia indicato dal centro antiveleni o dal medico. Non somministrare alcunchè a persone svenute. **Note per il medico:** Nessun antidoto specifico. Il trattamento in caso di esposizione deve essere mirato al controllo dei sintomi ed alle condizioni cliniche del paziente. Tenere a portata di mano la Scheda di Sicurezza e, se disponibile, il contenitore del prodotto o l'etichetta quando ci si rivolge ad un centro antiveleni o ad un medico per il trattamento. **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITÀ D'AZIONE

PIXXARO è un erbicida selettivo, sistemico, di post-emergenza, assorbito principalmente per via fogliare e traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema in tutta la pianta. L'erbicida agisce come regolatore di crescita di tipo auxinico. La crescita della pianta è rallentata già dopo poche ore, anche se l'effetto finale richiede qualche settimana.

USI AUTORIZZATI

PIXXARO è un erbicida di post-emergenza selettivo per **frumento tenero, frumento duro, avena vernina, farro, orzo, segale, triticale, olivo, agrumi, vivai di specie arboree ornamentali, aree incolte e tappeti erbosi ad uso ornamentale e/o sportivo**, efficace contro infestanti dicotiledoni. Non impiegare su avena a semina primaverile e su avena per sementi di moltiplicazione.

PER TRATTAMENTI SU: CEREALI AUTUNNO-VERNINI e PRIMAVERILI:

DOSE D'IMPIEGO

Cereali autunno-vernini e primaverili: 0,375 - 0,50 litri per ettaro

Avena vernina: 0,25 litri per ettaro

INFESTANTI CONTROLLATE alla dose di 0,5 litri per ettaro

Infestanti sensibili: ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*), borsapastore comune (*Capsella bursa-pastoris*), fiordaliso (*Cyanus segetum* = *Centaurea cyanus*), farinello comune (*Chenopodium album*), fumaria (*Fumaria officinalis*), attaccamano (*Galium aparine*), geranio a sette foglie (*Geranium dissectum*), geranio malvaccino (*Geranium rotundifolium*), geranio minore (*Geranium pusillum*), falsa ortica (*Lamium purpureum*), centocchio comune (*Stellaria media*), corregiola (*Polygonum aviculare*), poligono convolvolo (*Fallopia*=*Polygonum convolvulus*), papavero (*Papaver rhoeas*) inclusi i biotipi resistenti ad ALS-inibitori;

INFESTANTI CONTROLLATE alla dose di 0,375 litri per ettaro

Infestanti sensibili: fumaria (*Fumaria officinalis*), attaccamano (*Galium aparine*), geranio a sette foglie (*Geranium dissectum*), farinello comune (*Chenopodium album*), geranio malvaccino (*Geranium rotundifolium*), falsa ortica (*Lamium purpureum*), centocchio comune (*Stellaria media*), papavero (*Papaver rhoeas*);

INFESTANTI CONTROLLATE alla dose di 0,25 litri per ettaro

Infestanti sensibili: fumaria (*Fumaria officinalis*), attaccamano (*Galium aparine*), falsa ortica (*Lamium purpureum*).

EPOCA D'IMPIEGO

PIXXARO può essere applicato dalla fase di tre foglie vere alla fase di secondo nodo delle colture riportate in etichetta. I migliori risultati di efficacia possono essere ottenuti quando le infestanti bersaglio sono in fase di crescita attiva e di sviluppo non avanzato.

PER TRATTAMENTI SU:

OLIVO, AGRUMI (arancio, pompelmo, limone, limette, mandarino, shaddoc, pomelo, sweeties, tangelo, ugli ed altri ibridi, bergamotto, arance amare, chinotto ed altri ibridi, cedro, mano di Budda, clementine, tangerini, mineola ed altri ibridi, tangor), **VIVAI DI SPECIE ARBOREE ORNAMENTALI, AREE INCOLTE** (aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi stradali e ferroviarie, aeroporti, aree archeologiche, aree urbane, argini di canali, fossi e scoline, terreni preparati per il trapianto di forestali), **TAPPETI ERBOSI AD USO ORNAMENTALE E/O SPORTIVO**

DOSE D'IMPIEGO: 0,4 - 0,7 litri per ettaro, a seconda delle infestanti da controllare:

Continua su pag. 2

INFESTANTI CONTROLLATE alla dose di 0,6-0,7 litri per ettaro

Infestanti sensibili: attaccamano (*Gallium aparine*), ortica (*Urtica urens*), falsa ortica (*Lamium purpureum*), porcellana (*Portulaca oleracea*), malva (*Malva* spp.), saepola (*Conyza* spp.), grespino comune (*Sonchus* spp.)

INFESTANTI CONTROLLATE alla dose di 0,5 litri per ettaro

Infestanti sensibili: attaccamano (*Gallium aparine*), falsa ortica (*Lamium purpureum*), malva (*Malva* spp.), saepola (*Conyza* spp.)

INFESTANTI CONTROLLATE alla dose di 0,4 litri per ettaro

Infestanti sensibili: attaccamano (*Gallium aparine*), malva (*Malva* spp.), saepola (*Conyza* spp.)

EPOCA D'IMPIEGO

PIXXARO può essere applicato da gennaio a dicembre durante l'intero ciclo colturale (BBCH 00-99) rispettando l'intervallo di sicurezza. I migliori risultati di efficacia si ottengono quando le infestanti bersaglio sono in fase di crescita attiva e nelle prime fasi dello sviluppo.

Coltura	Dose per superficie effettivamente trattata	Dose massima per ettaro coltivato	Volumi d'acqua per superficie effettivamente trattata	Numero massimo di trattamenti per anno	Intervallo di sicurezza
Cereali autunno-vernini e primaverili	0,375-0,5 L/ha	0,375-0,5 L/ha	100-400 L/ha	1	50 giorni
Avena vernina	0,25 L/ha	0,25 L/ha	100-400 L/ha	1	
Olivio, Agrumi	0,4-0,7 L/ha*	0,2-0,35 L/ha	100-400* L/ha	1	7 giorni
Vivai di specie arboree ornamentali	0,4-0,7 L/ha*	0,2-0,35 L/ha	100-400* L/ha (a pieno campo)	1	Non necessari o
Aree incolte, tappeti erbosi ad uso ornamentale e/o sportivo	0,4-0,7 L/ha*	0,2-0,35 L/ha	100-400* L/ha	1	Non necessari o

* Non applicare su più del 50% della superficie dell'appezzamento

Per tutte le colture: eseguire 1 solo trattamento per anno.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Prima di eseguire l'applicazione assicurarsi che l'attrezzatura sia in buone condizioni, efficiente e sia stata calibrata secondo le indicazioni del costruttore. Nel corso del trattamento mantenere in funzione l'agitatore anche durante eventuali soste con irroratrice chiusa. Qualora l'irroratrice sia dotata di premiscelatore, utilizzare il sistema venturi di aspirazione in botte (meglio conosciuto come "aspira-prodotti").

Cereali autunno vernini e primaverili: Il trattamento è da eseguire a pieno campo utilizzando 100 – 400 litri d'acqua ad ettaro, secondo le attrezzature impiegate, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Il volume inferiore è da utilizzare solo su coltura ancora aperta ed infestanti piccole.

Olivio, agrumi, vivai di specie arboree ornamentali, aree incolte e tappeti erbosi ad uso ornamentale e/o sportivo: trattare massimo 50% della superficie, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti ed evitando di bagnare la coltura. Il trattamento a pieno campo con macchina irroratrice può essere effettuato utilizzando 100-400 L/ha di acqua.

Se sono presenti OLIVE cadute a terra nella zona trattata (solitamente olive utilizzate per la produzione di olio) queste non devono essere raccolte.

Aree incolte e tappeti erbosi ad uso ornamentale e/o sportivo: trattare massimo 50% della superficie, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Il trattamento con macchina irroratrice può essere effettuato utilizzando 100-400 L/ha di acqua.

Nota bene: La pioggia caduta dopo un'ora dall'applicazione non compromette l'efficacia del prodotto.

COLTURE IN SUCCESIONE

In base alle buone pratiche agricole e seguendo le normali rotazioni, non vi sono restrizioni circa le colture che possono essere seminate dopo la raccolta del cereale trattato con PIXXARO, purché si abbia cura di interrare i residui della coltura trattata, fatte salve le limitazioni dovute ad altri erbicidi usati in eventuali miscele estemporanee.

Avvertenze: non effettuare trasemine di colture leguminose.

DISTRUZIONE ACCIDENTALE DELLA COLTURA

In caso di distruzione accidentale della coltura per avversità meteorologiche, attacchi parassitari ecc. è possibile seminare esclusivamente:

- a partire da 1 mese dopo l'applicazione: qualsiasi cereale primaverile o mais;
- a partire da 2 mesi dopo l'applicazione: colture leguminose, previo interrimento dei residui colturali.

COMPATIBILITÀ: in caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

GESTIONE DELLA RESISTENZA: Il prodotto contiene Halauxifen-metile (ARYLEX™ active) e Fluroxipir, auxine sintetiche ad azione simile a quella dell'acido indolacetico. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio, ove applicabile, la rotazione colturale e la falsa semina o l'alternanza e l'associazione di Pixxaro con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare le autorità competenti (Servizio Fitosanitario regionale di riferimento) in caso di sospetta resistenza.

SELETTIVITÀ: PIXXARO è applicabile al suolo nel sottofila dell'oliveto e agrumeto, e dei vivai di specie arboree ornamentali: può essere utilizzato sia su piazzola che su fila per impianti intensivi, sempre rispettando l'indicazione di non superare il 50% della superficie dell'appezzamento. Per i vivai di specie arboree ornamentali, si raccomanda l'impiego solo su piante ben affrancate, utilizzando attrezzature schermate per l'applicazione del prodotto.

È applicabile su tutte le varietà di agrumeto e oliveto su piante di almeno 4 anni di età, senza restrizioni sul tipo di suolo. Non utilizzare in vivaio di olivo e agrumi. Durante l'applicazione non bagnare la vegetazione (tronco, specialmente su piante giovani, polloni e succhioni) avendo particolare cura di non bagnare le gemme. Il prodotto può causare leggeri ingiallimenti ed arricciamenti fogliari nel caso venga applicato direttamente sulle foglie, senza che questo abbia effetti negativi sulla produzione finale.

FITOTOSSICITÀ: su tutte le colture riportate in questa etichetta il prodotto può causare leggeri ingiallimenti ed arricciamenti fogliari a carattere transitorio (2-3 settimane), che non hanno però alcun impatto sul raccolto. Il prodotto può essere fitotossico per le colture NON indicate in etichetta. Evitare i trattamenti in giornate ventose e con temperature superiori ai 25°C all'ombra. Si raccomanda una distanza di sicurezza pari almeno a 5 metri in caso di colture sensibili quali: vite, alberi da frutto (esclusi olivo e agrumi), ortaggi, ornamentali e floreali in genere. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture sotto forma di deriva portata dal vento.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti almeno **50 giorni** prima della raccolta per cereali, **7 giorni** per olivo e agrumi.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE

Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. A questo scopo si raccomanda l'impiego di un detergente specifico per il lavaggio di attrezzature agricole ed irroratrici attenendosi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate nell'etichetta di tale prodotto.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039 0372 709900/709999 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19 marzo 2025