

ERADICOAT[®]MAX

Acaricida-insetticidaperorticole, floreali ed ornamentali,*agrumi,*vite da vino,*nocciolo e fragola*
Concentrato solubile

ERADICOAT[®]MAX

Composizione:

Maltodestrina g40
Coformulantiq.b.a g100



INDICAZIONI DI PERICOLO:

H318 Provoca gravi lesioni oculari; EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

PERICOLO

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto; P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini; P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso; P280 Indossare guanti protettivi/proteggere il viso; P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P310 contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI; P362+ P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente; P501 Smaltire il contenuto/recipiente in accordo alla normativa vigente.

Titolare dell'Autorizzazione:

CERTIS BELCHIM B.V.

Sede legale: Stadsplateau 16, Utrecht (Paesi Bassi)

Sede secondaria: Via Varese 25/D – 21047 Saronno Tel. 02 9609983

Officine di Produzione:

K&N EFTHYMIADIS SINGLE MEMBER S.A., Industrial Area of Thessaloniki, P.O. Box 48, 570 22 Sindos, Thessaloniki, Greece

Registrazione n. 18153 del Ministero della Salute del 14/11/22

Contenuto netto: Litri 0,1-0,5-1-5-10-20-25-50

Partitan.: vedere sulla confezione

©Marchio registrato da CERTIS BELCHIM B.V.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Indossare guanti di protezione ed un'adeguata protezione per il viso durante la manipolazione del formulato. Applicare il prodotto solo su colture in serre completamente chiuse (comprese le barriere continue superiori e laterali fino al livello del suolo). La chiusura della serra deve essere presente e mantenuta nel tempo.

*Per applicazioni su agrumi, vite da vino, nocciolo e fragola:

Pericoloso per le api. Non applicare mentre le api sono in piena attività. Non applicare in presenza di infestanti in fiore.

Falciare o asportare la vegetazione spontanea in fiore prima del trattamento. Per proteggere gli artropodi e gli insetti non bersaglio: impiegare la migliore tecnica di applicazione disponibile per minimizzare la deriva; rispettare una fascia di rispetto di 5 m del confine del campo.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un Centro Antiveleeni

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

ERADICOAT[®]MAX è un acaricida-insetticida ad ampio spettro per il controllo di acari, afidi ed aleurodidi su orticole, floreali ed ornamentali da usare solo in serre permanenti o semipermanenti. Nello specifico ERADICOAT[®] MAX agisce per azione fisica di contatto, bloccando l'insetto e portandolo alla morte in seguito all'ostruzione degli spiracoli tracheali. L'attività del prodotto può essere osservata già dopo 2-4 ore dall'applicazione.

COLTURA	PATOGENO	DOSE L/hl	DOSE MASSIMA L/ha
Orticole (con buccia edibile e non edibile) floreali ed ornamentali (in serra completamente chiusa)	Acari (forme adulte e giovanili), Afidi (forme adulte e giovanili), Aleurodidi(forme adulte, larve e uova)	2	60
*Fragola (in campo)	Acari (<i>Tetranychusurticae</i>)	1.5-2	30
*Agrumi	Acari (<i>Tetranychusurticae</i> , <i>Panonychuscitri</i> , etc.),Cocciniglie (<i>Planococcus spp.</i> , <i>Iceryapurchasi</i> , <i>Delottococcusaberia</i>)	1-1.5	45
*Vite da vino	Acari eriofidi	1-1.5	22.5
*Nocciolo	Acari	1-1.5	45

Orticole (con buccia edibile e non edibile) floreali ed ornamentali (serra): a volumi normali applicare ERADICOAT®MAX al dosaggio di 20 L/ha. Usare volumi di acqua compresi tra i 200-3000 L/ha. Per volumi d'acqua superiori a 1000 L/ha utilizzare la dose di 2 L/hl fino ad un massimo di 60 L/ha. Ripetere le applicazioni ogni 7 giorni fino ad un massimo di 20 applicazioni per ciclo colturale. Non superare la concentrazione di prodotto del 2% (20 ml/litro di acqua).

***Fragola (in campo):** impiegare ERADICOAT MAX al dosaggio di 1.5-2 L/hl con un volume d'acqua di 200-1500 L/ha fino ad un massimo di 30 L/ha. Effettuare un massimo di 5 trattamenti ad un intervallo di 3-7 giorni.

***Agrumi:** impiegare ERADICOAT MAX al dosaggio di 1-1.5 L/hl con un volume d'acqua di 1000-3000 L/ha fino ad un massimo di 45 L/ha. Effettuare un massimo di 5 trattamenti ad un intervallo di 5-10 giorni.

***Vite da vino:** impiegare ERADICOAT MAX al dosaggio di 1-1.5 L/hl con un volume d'acqua di 500-1500 L/ha fino ad un massimo di 22.5 L/ha. Effettuare un massimo di 5 trattamenti ad un intervallo di 5-10 giorni.

***Nocciolo:** impiegare ERADICOAT MAX al dosaggio di 1-1.5 L/hl con un volume d'acqua di 1000-3000 L/ha fino ad un massimo di 45 L/ha. Effettuare un massimo di 5 trattamenti ad un intervallo di 5-10 giorni.

Per una corretta distribuzione del prodotto utilizzare volumi di acqua tali da assicurare una completa ed uniforme bagnatura della coltura da trattare, avendo cura di bagnare anche la pagina inferiore delle foglie e prestando particolare attenzione alla presenza di focolai di infestazione.

Per avere la massima efficacia del prodotto si consiglia di trattare su vegetazione asciutta, nelle ore più calde e in giornate soleggiate. Una rapida asciugatura del prodotto consente una veloce immobilizzazione dell'insetto.

COMPATIBILITÀ: in caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Evitare la fuoriuscita in ambiente.

FITOTOSSICITÀ

Considerata l'ampia disponibilità di colture si consiglia di effettuare saggi preliminari prima dell'applicazione al fine di evitare fenomeni di fitotossicità. Nel caso delle piante floreali ed ornamentali, non applicare in presenza della parte floreale.

PREVENZIONE DELLA RESISTENZA

ERADICOAT® MAX non ha evidenziato fenomeni di resistenza nei confronti degli insetti proposti in etichetta. Si consiglia di applicarlo in modo alternato con altri formulati a diverso meccanismo di azione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Agitare la confezione prima dell'uso.

Riempire il serbatoio dell'irroratrice fino a metà del volume totale con acqua pulita, quindi aggiungere ERADICOAT®MAX alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume. Evitare di agitare troppo per limitare la formazione di schiuma. Applicare immediatamente dopo la preparazione della miscela.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Il prodotto è stabile per almeno 2 anni se conservato nella sua confezione integra.

***VALIDITA' AUTORIZZAZIONE dal 2 maggio 2023 al 29 agosto 2023**