

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 settembre 2003 (GU n. 246 del 22-10-2003)

Attuazione della decisione del Consiglio 2003/199/CE del 18 marzo 2003, relativa ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva aldicarb che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Vista la decisione del Consiglio 2003/199/CE del 18 marzo 2003, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto (6) delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE;

Visto inoltre l'art. 2, comma 3, della citata decisione, che stabilisce per l'Italia la possibilita' di mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di aldicarb per il controllo degli organismi nocivi su barbabietola da zucchero, tabacco e nei vivai di piante legnose e di vite (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detti impieghi;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, che stabilisce la revoca dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, elencati nell'allegato A al presente decreto, e il mantenimento delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato B al presente decreto, che erano gia' autorizzati per l'impiego su barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose e di vite e per i quali le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta;

Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio, fissato al 18 settembre 2004 dall'art. 3, lettera a) della citata decisione 2003/199/CE, dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb di cui all'allegato A al presente decreto, si applica anche ai prodotti fitosanitari, di cui all'allegato B del presente decreto, che riportano in etichetta usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali;

Considerato altresì che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, che sono elencati nell'allegato B al presente decreto e che saranno in commercio al 30 giugno 2007, e' fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera b) della citata decisione del Consiglio 2003/199/CE;

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose e di vite (usi essenziali), dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva aldicarb;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per

chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati, e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva aldicarb non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva aldicarb, riportati nell'allegato A al presente decreto, sono revocate a decorrere dai termini indicati dalla citata decisione 2003/199/CE del Consiglio.

Art. 3.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva aldicarb, riportati nell'allegato B al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 giugno 2007, limitatamente ai soli impieghi su barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose e di vite (usi essenziali) e in conformita' alle condizioni indicate nelle rispettive etichette, riportate in allegato C al presente decreto.

Art. 4.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, riportati nell'allegato A al presente decreto, nonche' dei prodotti di cui all'allegato B, relativamente agli usi diversi da quelli essenziali elencati nella quinta colonna del citato allegato B, e' consentita fino al 18 settembre 2004.

2. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze che risulteranno esistenti in commercio al 30 giugno 2007 dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, riportati nell'allegato B al presente decreto, e' consentita fino al 31 dicembre 2007.

3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca dei prodotti di cui all'allegato A al presente decreto, delle limitazioni e delle nuove condizioni di impiego fissate per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato B al presente decreto, nonche' del rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2003

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 384

Allegato A

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI ALDICARB
LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE

Prodotto	Impresa	N. reg.	Data reg.
Aldicarb Adica Agrocab GR	Adica S.r.l.	7036	26/03/1987
Aldicarb-Vilcar Dicarb 5G	Agricoltura italiana S.r.l.	5310	11/04/1983
Aldicarb 5G Enichem Agricoltura	Isagro S.p.a.	5885	25/04/1984
Aldicarb/Carbofuran Siapa 5G (Geocarb Duo)	Siapa S.r.l.	6747	19/06/1986
Aldicarb 5G Siapa (Temik)	Siapa S.r.l.	2185	26/03/1976
Aldicarb 5G Silia	Siapa S.r.l.	5682	12/01/1984

Allegato B

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI ALDICARB LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO PROROGATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE AGLI IMPIEGHI SU BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, TABACCO, VIVAI (USI ESSENZIALI)

Prodotto	Impresa	N. reg.	Data reg.	Usi essenziali
Aldicarb Bayer Cropscience Temik 5G	Bayer Cropscience S.r.l.	2001	23/03/1976	Barbabetola da zucchero, tabacco, vivai di piante legnose e di vite
Aldicarb Chemia Fitosan 4,75	Chemia S.p.a.	11229	4/03/2002	Barbabetola da zucchero, tabacco, vivai di piante legnose
Aldicarb 5G Chemia	Chemia S.p.a.	4963	15/10/1982	Barbabetola da zucchero, tabacco, vivai di piante legnose
Aldicarb Emme Italia Eporin granuli	Emme Italia S.r.l.	5115	29/11/1982	Barbabetola da zucchero, tabacco, vivai di piante legnose
Aldicarb				Barbabetola da zucchero, tabacco, vivai

Sgaravatti	N. Sgaravatti &			di piante
Nemacarb 5G	C. S.p.a.	9682	7/7/1998	legnose

Aldicarb Sipcam				Barbabietola da
Temik 5G	Sipcam S.p.a.	1652	26/3/1976	zucchero

Allegato C

ETICHETTE DEI PRODOTTI A BASE DI ALDICARB, DI CUI ALL'ALLEGATO B, LE
CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO PROROGATE FINO
AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE AGLI IMPIEGHI SU BARBABIETOLA DA
ZUCCHERO, TABACCO, VIVAI (USI ESSENZIALI)

Vedere allegato da pag. 32 a pag. 37 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.


ETICHETTE DEI PRODOTTI A BASE DI ALDICARB, DI CUI ALL'ALLEGATO B, LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO PROROGATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE AGLI IMPIEGHI SU BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, TABACCO, VIVAI (USI ESSENZIALI)

Aldicarb Bayer CropScience TEMIK® 5G
Insetticida nematocida sistemico in granuli protetti per l'impiego su tabacco, barbabietola da zucchero, vivai di piante legnose e di vite

Aldicarb Bayer CropScience TEMIK® 5G

COMPOSIZIONE

Aldicarb puro 5 g
Supporti q.b. a 100 g



MOLTO TOSSICO

Partita n.: *

FRASI DI RISCHIO:

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Rischio d'intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare sotto chiave
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione:



Bayer CropScience

Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano

Officina di Produzione:

Registrazione n. 2001 del 23/03/76 del Ministero della Sanità

Contenuto: 2,5 - 10 - 20 kg

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

© Marchio registrato

Norme Precauzionali:

Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Evitare la contaminazione dei corpi idrici

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncospasmo con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

TEMIK 5G è un nematocida insetticida sistemico granulare che agisce per contatto ed ingestione. Temik 5G è selettivo per le colture registrate. Se applicato su terreno sufficientemente umido viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e traslocato per via linfatica in tutti gli organi della pianta.

RACCOMANDAZIONI GENERALI D'IMPIEGO

Distribuzione del prodotto
Data l'attività sistemica e l'assorbimento per via radicale della sostanza attiva è necessario distribuire il prodotto nella zona dell'apparato radicale della coltura. TEMIK 5G deve essere distribuito esclusivamente con distributore meccanico (esempio microgranulatore). All'atto del trattamento immettere nell'apparecchiatura di distribuzione la quantità effettivamente necessaria per il trattamento. Nel caso che a fine trattamento avanzati del prodotto volare e pulire l'attrezzatura di distribuzione e reintrodurre il prodotto nella confezione originale. Assicurarsi che non vi siano dispersioni di prodotto durante le operazioni di riempimento (o svuotamento) dell'attrezzatura di distribuzione. Assicurarsi che non vi sia fuoriuscita del prodotto durante la manovra alle testate degli appezzamenti e durante lo spostamento da un campo all'altro. Assicurarsi che l'attrezzatura di distribuzione sia correttamente larata. TEMIK 5G non deve essere distribuito con modalità diverse da quelle indicate. I quanti forniti unitamente alla confezione sono destinati unicamente alla manipolazione di Temik 5G.

Incorporazione nel terreno

È indispensabile incorporare nel terreno Temik 5G mediante interrimento meccanico all'atto della distribuzione o immediatamente dopo per assicurare l'efficacia ed evitare rischi per l'ambiente. Dopo l'incorporazione nel terreno è opportuno effettuare un'irrigazione per aspersione. Evitare di ripetere l'irrigazione per almeno 72 ore e non eccedere nei quantitativi di acqua nelle irrigazioni successive.

RACCOMANDAZIONI D'IMPIEGO

Tabacco:

contro nematodi galligeni e cistiferi, insetti terricoli (elateridi, nottue) e fogliari (afidi inipi e pulce). TEMIK 5G si impiega:

- trattamento in vivaio

- Dose raccomandata: 6 g/mq
- in pre-semina seguito da incorporazione meccanica alla profondità di 10 - 15 cm;
- sulle giovani piantine (stadio di due foglie vere) seguito da incorporazione per irrigazione;
- trattamento pre-trapianto due settimane prima dell'estirpazione delle piantine, quando si temono forti infestazioni, seguito da incorporazione per irrigazione.

- trattamento in campo al momento del trapianto
distribuire Temik 5G mediante microgranulatore montato sulla trapiantatrice alla dose di 80-100 Kg/ha per trattamenti su tutta la superficie, 30-35 kg/ha per trattamenti su una fascia di circa 20-30 cm e 6-12 g/m lineare localizzando il prodotto nel solco di trapianto.

- trattamento in campo alla rincalzatura
distribuire Temik 5G (30-35 kg/ha su una fascia di 30 cm circa) mediante microgranulatore montato sulla rotolafresatrice dotata di rincalzatori (i microgranulatori devono distribuire il prodotto davanti alla fresatrice).

Barbabietola da zucchero:

contro nematodi cistiferi e galligeni, insetti terricoli (agrotidi), fogliari (afidi, alica, mosca) e miriapodi. Distribuire 30 Kg/ha di Temik 5G nel solco di semina mediante microgranulatore applicato alla semina. Per la lotta ai soli insetti è possibile ridurre la dose a 20 Kg/ha.

Vivai di piante legnose (fruttiferi, agrumi, ornamentali, forestali) e di vite e piante a dimora non ancora in produzione

contro: nematodi, insetti terricoli (oziorinco) e fogliari (afidi, cicadine, ecc.). Temik 5G controlla sia i nematodi galligeni che i nematodi mobili responsabili della trasmissione di virus nei vivai di vite, pesco (*Xiphinema index*, ecc.), ed agrumi (*Tylenchus semipenetrans*). Distribuire Temik 5G a pieno campo prima del trapianto alla dose di 100-150 Kg/ha ed incorporare immediatamente il prodotto a 10-15 cm di profondità. Temik 5G può essere applicato anche su bande di 50 cm di larghezza in corrispondenza delle file di trapianto o localizzato nella zona delle piantine riducendo la dose per ettaro in funzione della superficie effettivamente trattata

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Temik 5G si usa da solo

FITOTOSSICITA'

TEMIK 5G, se impiegato secondo le modalità raccomandate, non è fitotossico per le colture indicate

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, gli uccelli ed il bestiame. TEMIK 5G deve essere applicato una sola volta all'anno e cioè alla semina od al trapianto od alla ripresa vegetativa della coltura

Intervallo di sicurezza:

Tabacco 80 giorni;

Non necessario per le altre colture

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle prodotte istruzioni e condizione essenziali per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alla pianta, alle persone ed agli animali.

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Officina di produzione:

Bayer CropScience - Woodbine (Georgia) - U.S.A.

Officine di confezionamento:

AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)

CMPA, Beziers (F)

Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)

incorporazione nel terreno. Dopo l'incorporazione nel terreno è opportuno effettuare l'irrigazione per asperzione. Evitare di ripetere l'irrigazione per almeno 72 ore e non eccedere nei quantitativi di acqua nelle irrigazioni successive. Prima del trattamento si raccomanda di controllare la taratura dell'apparecchio distributore. Effettuare un unico trattamento al terreno al momento della semina.

ATTENZIONE: il prodotto va impiegato esclusivamente con mezzi meccanici

- **Tobacco** - Contro *Nematodi* libari e galligeni, *Afici*, *Attica*, *Notte*, *Tripidi*, *Insetti* del terreno, il prodotto può essere impiegato sui semenzali di tabacco come trattamento preventivo, seguito da incorporazione meccanica alla profondità di 10-15 cm; come trattamento in presenza di geminelli (stadio due foglie vere) e quindi con l'incorporazione per irrigazione; come trattamento pretrapianto, due settimane prima dell'essiccazione delle piantine, seguito da incorporazione per irrigazione. La dose consigliata in qualunque trattamento è di 6 g/mq.
- In pieno campo, al momento del trapianto, localizzando il prodotto con apposito e adeguato microgranulatore montato sulla trapiantatrice, localizzando il prodotto nel solo alla dose di 80-100 kg/ha (6-12 g/m) a seconda della distanza tra le file.
- **Vivai di piante legnose** - Contro *Aleurididi*, *Nematodi*, *Afici*, *Acanthi*, *Oziorinchi*, *Cocciniglie*, *Minatori fogliari*, alla dose di 100-150 kg/ha in pre- e post-trapianto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Usare il prodotto da solo.

FITOTOSSICITÀ: Alle dosi di 30-40 kg/ha al consiglio di distanziare di 2-3 cm il prodotto dal seme per evitare un ritardo iniziale di vegetazione.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Impiegarlo una sola volta all'anno al momento della semina o al trapianto delle colture.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 80 giorni per il Tabacco, non necessario per le altre colture.

ATTENZIONE! Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto della predetta istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Attenzione: data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 250 del 23/04/2001

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Aldicarb Chemia Fitosan 4.75

Nematocida-insetticida sistemico per le colture di barbabietola da zucchero, tabacco, vivai di piante legnose
Granuli con rivestimento protettivo

Aldicarb Chemia Fitosan 4.75

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:
Aldicarb puro g 4,75
Supporti q.b. a 100

Fasi di Rischio:

Affiancamento basico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri


Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone

Usare indumenti protettivi e guanti adatti

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare l'etichetta).

Conservare soltanto nel recipiente originale.



MOLTO TOSSICO



4.750 g - 5.000 g (FE) - 5.000 g (FE)

Officina di Produzione:

Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Registrazione n. 11228 Ministero della Salute del 04/03/2002

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10 - 25

Partita n.:

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:

Conservare la confezione ben chiusa. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non distanziare il prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Evitare la contaminazione di corpi idrici.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Inibire l'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame facile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: Disturbi dell'accomodazione, miopia, lacrimazione, scialorrea e broncospasmo con broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia.

Sintomi nicotinici: Tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: Atropina.

Controindicazioni: Oesime.

Consultare un Centro Antiveneni

MODALITÀ DI IMPIEGO

CARATTERISTICHE: nematocida, insetticida sistemico granulare.

Se applicato sul terreno sufficientemente umido, viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e trasportato per via linfatica in tutti gli organi della pianta. Grazie alla sua persistenza, selettività e polivalenza, il prodotto è consigliabile nella tecnica moderna della semina in posto. All'atto del trattamento, immettere nell'apparecchiatura di distribuzione la quantità effettivamente necessaria per il trattamento.

Nel caso che a fine trattamento avanzati del prodotto, vuotare e pulire l'attrezzatura di distribuzione e reintrodurre il prodotto nella confezione originale. Assicurarsi che non vi siano dispersori di prodotto durante le operazioni di riempimento (e svuotamento) dell'attrezzatura di distribuzione. Assicurarsi che non vi sia fuoriuscita del prodotto durante le manovre alle testate degli apparecchiamenti a durante lo spessamento da un campo all'altro. Il prodotto non deve essere distribuito con modalità diverse da quelle indicate.


CULTURE PROTETTE

• **Barbabietola da zucchero**

- PARASSITI COMBATTUTI: Insetti del terreno: *Meloidina*, *Grafolius*, *pa*, *Atoma*, *Filotei* fogliari, *Afici*, *Pegomidi*, *Afici*, *Nottidi*, *Nematodi* *Indistati* (*Heterodera*), *libari* e *galligeni* (*Ditylenchus*, *Meloidogyne*); *Minipodi*; *Bianchi* *guttulati*.
- DOSI D'IMPIEGO: localizzato, per una difesa totale alla dose di 20 kg/ha; in caso di forte infestazione di nematodi (*Heterodera*), usare 30-40 kg/ha localizzati 2-3 cm lateralmente alla linea del seme.
- EPOCA D'IMPIEGO: Alla semina della coltura. Il trattamento esercita un controllo dei principali fitofagi per circa 50-60 giorni, fino allo stadio di 4-5 foglie vere.
- METODI D'IMPIEGO: Alla dose normale d'impiego, applicare il prodotto durante la semina, localizzato al livello dei germinelli sul fondo del solco, esclusivamente con un distributore di granuli montato sulla seminatrice. Nella necessità di dover impiegare 30-40 kg/ha di prodotto localizzato, si consiglia di applicare lateralmente al seme a una distanza di 2-3 cm. Interare poi il prodotto contemporaneamente al seme.

Aldicarb 5G Chemia

Nematocida-insetticida sistemico per le colture di barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose
Granuli con rivestimento protettivo



MOLTO TOSSICO

Aldicarb 5G Chemia

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Aldicarb puro g 4,75

Supporti q.b. a 100

Frasi di Rischio:

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Non respirare le polveri

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone

Usare indumenti protettivi e guanti adatti

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Conservare soltanto nel recipiente originale



Officina di Produzione:

Chemia S.p.A. - S.S. 266 km 46 - S. Agostino (FE)

Registrazione n. 4963 Ministero della Sanità del 15/10/1982

Contenuto netto : kg 1 - 5 - 10 - 25

Partita n.:

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:

Conservare la confezione ben chiusa. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non distaccare il prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Evitare la contaminazione di corpi idrici.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame stabile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: Disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miopia, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con bradicardia, vomito, diarrea, bradicardia.

Sintomi nicotinici: Tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi, flaccida generalizzata, collasso circolatorio.

Terapia: Atropina.

Controindicazioni: Ossime.

Consultare un Centro Antiveneni

MODALITÀ DI IMPIEGO

CARATTERISTICHE: nematocida, insetticida sistemico granulare.

Se applicato su terreno sufficientemente umido, viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e trasportato per via linfatica in tutti gli organi della pianta. Grazie alla sua persistenza, selettività e polivalenza, il prodotto è consigliabile nella tecnica moderna della semina in posto. All'atto del trattamento, immettere nell'apparecchiatura di distribuzione la quantità effettivamente necessaria per il trattamento.

Nel caso che a fine trattamento avanzzi del prodotto, vuotare e pulire l'attrezzatura di distribuzione e reintrodurre il prodotto nella confezione originale. Assicurarsi che non vi siano dispersioni di prodotto durante le operazioni di riempimento (e svuotamento) dell'attrezzatura di distribuzione. Assicurarsi che non vi sia fuoriuscita del prodotto durante le manovre alle testate degli appezzamenti e durante lo spostamento da un campo all'altro. Il prodotto non deve essere distribuito con modalità diverse da quelle indicate.

COLTURE PROTETTE

• **Barbabietola da zucchero**

PARASSITI COMBATTUTI: Insetti del terreno: *Meloidontha*, *Grillotalpa*, *Atomaria*; Frotagi fogliari. *Africa*, *Pegonia*, *Afidi*, *Notiudi*; Nematodi incistati (*Heterodera*), liberti e galligeni (*Oxylenchus*, *Meloidogyne*); Miriapodi: *Blattellus gertulatus*.

• **OGGI D'IMPIEGO:** - localizzato, per una difesa totale alla dose di 20 kg/ha; in caso di forte infestazione di nematodi (*Heterodera*), usare 30-40 kg/ha localizzati 2-3 cm lateralmente alla linea del seme.

• **EPOCA D'IMPIEGO:** - Alla semina della coltura. Il trattamento esercita un controllo dei principali frotagi per circa 50-60 giorni, fino allo stadio di 4-6 foglie vere.

• **METODI D'IMPIEGO:** - Alla dose normale d'impiego, applicare il prodotto durante la semina, localizzato al livello dei giomeruli sul fondo del solchietto, esclusivamente con un distributore di granuli montato sulla seminatrice. Nella necessità di dover impiegare 30-40 kg/ha di prodotto localizzato, si consiglia di applicarlo lateralmente al seme a una distanza di 2-3 cm. Interare poi il prodotto contemporaneamente al seme.

Incorporazione nel terreno. Dopo l'incorporazione nel terreno è opportuno effettuare l'irrigazione per aspersione. Evitare di ripetere l'irrigazione per almeno 72 ore e non eccedere nei quantitativi di acqua nelle irrigazioni successive. Prima del trattamento si raccomanda di controllare la taratura dell'apparecchio distributore. Effettuare un unico trattamento al terreno al momento della semina.

ATTENZIONE: Il prodotto va impiegato esclusivamente con mezzi meccanici

• **Tabacco** - Contro Nematodi liberi e galligeni, Afidi, Altica, Nottue, Tripidi, Insetti del terreno. Il prodotto può essere impiegato sui semenzali di tabacco come trattamento presemina, seguito da incorporazione meccanica alla profondità di 10-15 cm, come trattamento in presenza di germinali (stadio due foglie vere) e quindi con l'incorporazione per irrigazione, come trattamento preimpianto, due settimane prima dell'estirpazione delle piantine, seguito da incorporazione per irrigazione. La dose consigliata in qualunque trattamento è di 5 g/mq. In pieno campo, al momento del trapianto, localizzando il prodotto con apposito e adeguato microgranulatore montato sulla trapiantatrice, localizzando il prodotto nel solco alla dose di 80-100 kg/ha (5-12 g/m) a seconda della distanza tra le file.

• **Vivai di piante legnose** - Contro Aleurodidi, Nematodi, Afidi, Acari, Oziotriche, Cocciniglie, Minatori fogliari, alla dose di 100-150 kg/ha in pre- e post-trapianto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Usare il prodotto da solo.

FITOTOSSICITÀ: Alle dosi di 30-40 kg/ha si consiglia di distanziare di 2-3 cm il prodotto dal seme per evitare un ritardo iniziale di vegetazione.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Impiegare una sola volta all'anno al momento della semina o al trapianto delle colture.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 80 giorni per il Tabacco, non necessario per le altre colture.

Attenzioni: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Attenzione: data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

**SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

Aldicarb Emme Italia Eporin Granuli

Insetticida-Nematocida Granulare

Partita n. °

Composizione:

Aldicarb puro.....g 4,75
Coformulanti q.b. a g 100

EMME ITALIA SRL
EMME ITALIA SRL - Via Cesare Boldrini, 24 - Bologna



TOSSICO

Frasi di Rischio :

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza :

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Conservare soltanto nel recipiente originale.

Officina di produzione :

Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE)
Guangdong Panyu Shikou Fine Chemicals - Jiao Tan Work area, Shikou, Panyu, Guangzhou, Guangdong (R.P.C.)

Contenuto netto : kg 1 - 5 - 10 - 20

Registrazione n. 5115 Ministero della SANITA' del 29/11/1982

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; Conservare la confezione ben chiusa; Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; Evitare di respirarne i vapori; Non operare contro vento; Evitare il contatto con la pelle e gli occhi; Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi; Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. **Sintomi muscarinici:** Disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. **Sintomi nicotinici:** Tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. **Terapia:** Atropina. **Controindicazioni:** Ossime.

Consultare un Centro Antiveneni

MODALITÀ D'IMPIEGO

E' un geodisinfestante del terreno per la coltura della barbabietola da zucchero. Agisce per via sistemica attraverso la linfa una volta assorbito dalle radici della coltura da proteggere. E' selettivo e persistente, pertanto è in grado di controllare per lungo tempo la coltura dall'attacco di numerosi parassiti. Data l'attività sistemica e l'assorbimento per via radicale della sostanza attiva, è necessario distribuire il prodotto nella zona dell'apparato radicale della coltura. All'atto del trattamento, immettere nell'apparecchiatura di distribuzione la quantità effettivamente necessaria per il trattamento. Nel caso che a fine trattamento avanzi del prodotto, vuotare e pulire l'attrezzatura di distribuzione e reintrodurre il prodotto nella confezione originale. Assicurarsi che non vi siano dispersioni di prodotto durante le operazioni di riempimento (e svuotamento) dell'attrezzatura di distribuzione. Assicurarsi che non vi sia fuoriuscita del prodotto durante le manovre alle testate degli appezzamenti e durante lo spostamento da un campo all'altro. Assicurarsi che l'attrezzatura di distribuzione sia correttamente tarata. Il prodotto non deve essere distribuito con modalità diverse da quelle indicate.

Incorporazione nel terreno: E' indispensabile incorporare nel terreno Eporin Granuli mediante interrimento meccanico all'atto della distribuzione o immediatamente dopo per assicurare l'efficacia ed evitare i rischi per l'ambiente. Dopo l'incorporazione nel terreno è opportuno effettuare l'irrigazione per asperzione. Evitare di ripetere l'irrigazione per almeno 72 ore e non eccedere nei quantitativi di acqua nelle irrigazioni successive.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO : è particolarmente indicato per il controllo di Elateridi, Melolontha, Atomaria, Grillotalpa, Altica, Cleono, Lixus, Afidi, Pegomya o Mosca, Agrotis, Caradrina, Mamestra e dei nematodi liberi e galligeni (Ditylenchus, Meloidogyne) e incistati (Heterodera).

DOSI

20 kg/ha al momento della semina localizzato lungo le file e distribuito esclusivamente con seminatrice meccanica. Nel caso si debbano controllare attacchi gravi, la dose può essere elevata a 30-40 kg/ha applicandolo lateralmente al seme ad una distanza di 2-3 cm.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI ATTENZIONE : Il prodotto va impiegato esclusivamente con mezzi meccanici

COMPATIBILITÀ : il prodotto va applicato da solo.

FITOTOSSICITÀ : alle dosi massime il prodotto deve essere distanziato di 2-3 cm dal seme onde evitare ritardi di vegetazione.

RISCHI DI NOCIVITÀ : il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Il prodotto deve essere applicato una sola volta all'anno e cioè alla semina o al trapianto o alla ripresa vegetativa della coltura.

Attenzione ! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Aldicarb Sgaravatti Nemacarb 5G

Nematocida-insetticida sistemico per le colture di
barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose
Granuli con rivestimento protettivo

Aldicarb Sgaravatti Nemacarb 5G

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Aldicarb puro g 4,75

Supporti q.b. a 100

Pericoli di Rischio:

Altamente tossico per inalazione,
ingestione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Non respirare le polveri

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone

Usare indumenti protettivi e guanti adatti

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

Conservare soltanto nel recipiente originale.



MOLTO TOSSICO



SEMENTI dal 1820

N. SGARAVATTI & C. S.p.A.

Via Nazionale, 119 - 62020 Pergine Valdarno (AR)

Officina di Produzione:

Chemia S.p.A. - S. S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Registrazione n. 9882 Ministero della Sanità del 07/07/98

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10 - 25

Partita n. *

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

norme Precauzionali: Conservare la confezione ben chiusa; Non operare contro vento; Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; Non distarsi dal prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni; Evitare la contaminazione di corpi idrici.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Inibitori dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscolari: Disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miopia, lacrimazione, sciolorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia.

Sintomi circolatori: Tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi facciale generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: Atropina.

Controindicazioni: Ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ DI IMPIEGO

CARATTERISTICHE: nematocida, insetticida sistemico granulare.

Se applicato su terreno sufficientemente umido, viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e trasportato per via linfatica in tutti gli organi della pianta. Grazie alla sua persistenza, selettività e polivalenza, il prodotto è consigliabile nella tecnica moderna della semina in posto. All'atto del trattamento, immettere nell'apparecchiatura di distribuzione la quantità effettivamente necessaria per il trattamento. Nel caso che a fine trattamento avanzzi del prodotto, vuotare e pulire l'apparecchiatura di distribuzione e reintrodurre il prodotto nella confezione originale. Assicurarsi che non vi siano dispersioni di prodotto durante le operazioni di riempimento (e svuotamento) dell'apparecchiatura di distribuzione. Assicurarsi che non vi sia fuoriuscita del prodotto durante le manovre alle testate degli appezzamenti e durante lo spostamento da un campo all'altro. Il prodotto non deve essere distribuito con modalità diverse da quelle indicate.

COLTURE PROTETTE

Barbabietola da zucchero

PARASSITI COMBATTUTI: Insetti dal terreno: *Melolontha*, *Grillotalpa*, *Atomaria*; Filofagi fogliari: *Africa*, *Pegomya*, *Afridi*; Notturni: *Nematodi* (nematodi (*Heterodera*)), *liberi e galligeni* (*Ditylenchus*, *Meibomyne*), *Mirafopodi*: *Blennius guttulatus*.

DOSI D'IMPIEGO: localizzato, per una difesa totale alla dose di 20 kg/ha; in caso di forte infestazione di nematodi (*Heterodera*), usare 30-40 kg/ha localizzati 2-3 cm lateralmente alla linea del seme.

EPOCA D'IMPIEGO: Alla semina della coltura. Il trattamento esercita un controllo dei principali filofagi per circa 50-60 giorni, fino allo stadio di 4-6 foglie vere.

METODI D'IMPIEGO: Alla dose normale d'impiego, applicare il prodotto durante la semina, localizzato al livello dei glomeruli sul fondo del solco, esclusivamente con un distributore di granuli montato sulla seminatrice. Nella necessità di dover impiegare 30-40 kg/ha di prodotto localizzato, si consiglia di applicarlo lateralmente al seme a una distanza di 2-3 cm. Interrare poi il prodotto contemporaneamente al seme.

Incorporazione nel terreno. Dopo l'incorporazione nel terreno è opportuno effettuare l'irrigazione per asperione. Evitare di ripetere l'irrigazione per almeno 72 ore e non eccedere nei quantitativi di acqua nelle irrigazioni successive.

Prima del trattamento si raccomanda di controllare la taratura dell'apparecchio distributore. Effettuare un unico trattamento al terreno al momento della semina.

ATTENZIONE: il prodotto va impiegato esclusivamente con mezzi meccanici

- Tabacco: Contro Nematodi liberi e galligeni, *Afridi*, *Africa*, *Notturni*, *Triptidi*. Insetti del terreno. Il prodotto può essere impiegato sui semi di tabacco come trattamento pre-semina, seguito da incorporazione meccanica alla profondità di 10-15 cm; come trattamento in presenza di germinelli (stadio due foglie vere) e quindi con l'incorporazione per irrigazione; come trattamento pre-trapianto, due settimane prima dell'estirpazione delle piantine, seguito da incorporazione per irrigazione. La dose consigliata in qualunque trattamento è di 5 g/mq.

In pieno campo, al momento del trapianto, localizzando il prodotto con apposito e adeguato microgranulatore montato sulla trapiantatrice, localizzando il prodotto nel solco alla dose di 80-100 kg/ha (6-12 g/m) a seconda della distanza tra le file.

- Vivai di piante legnose: Contro *Aleurorididi*, *Nematodi*, *Afridi*, *Acari*, *Oziornini*, *Cocciniglie*, *Minatori fogliari*, alla dose di 100-150 kg/ha in pre- e post-trapianto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Usare il prodotto da solo.

FITOTOSSICITÀ: Alle dosi di 30-40 kg/ha si consiglia di distanziare di 2-3 cm il prodotto dal seme per evitare un ritardo iniziale di vegetazione.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Impiegare una sola volta all'anno al momento della semina o al trapianto delle colture.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 80 giorni per il Tabacco, non necessario per le altre colture.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Attenzione: la data l'etichetta deve essere quella del prodotto. Il prodotto non è consentito esclusivamente al trattamento di piante da frutto e di patatine di cui all'art. 26 del D.P.R. 280 del 28.5.93.

**SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**


ALDICARB SIPCAM

Temik® 5G

**Nematocida - Insetticida Sistemico per la coltura di
Barbabietola da zucchero**

ALDICARB SIPCAM-(Temik 5G) - Composizione:

- Aldicarb puro g. 4,75
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a g. 100



TOSSICO

® marchio registrato SIPCAM
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici
per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 1652 del 26.3.76
del Ministero della Sanità

Officina di produzione: SIPCAM SpA
- Saterano sul Lambro (Lodi)

Taglie: 1-5-10 Kg

**IL CONTENITORE NON PUO'
ESSERE RIUTILIZZATO**

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Conservare nel recipiente originale.

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23.04.2001.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa. Non operare controvento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Evitare la contaminazione di corpi idrici.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.

Sintomi nicotici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina

Controindicazioni: ossime

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Caratteristiche: nematocida, insetticida sistemico granulare. Se applicato su terreno sufficientemente umido, viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e trasportato per via linfatica in tutti gli organi della pianta. Grazie alla sua persistenza, selettività e polivalenza, il prodotto è consigliabile nella tecnica moderna della semina in posto.

All'atto del trattamento immettere nell'apparecchiatura di distribuzione la quantità effettivamente necessaria per il trattamento. Nel caso che a fine trattamento avanzi del prodotto, vuotare e pulire l'attrezzatura di distribuzione e reintrodurre il prodotto nella confezione originale.

Assicurarsi che non vi siano dispersioni di prodotto durante le operazioni di riempimento (o svuotamento) dell'attrezzatura di distribuzione.

Assicurarsi che non vi sia fuoriuscita del prodotto durante le manovre alle testate degli appezzamenti e durante lo spostamento da un campo all'altro.

Temik 5G non deve essere distribuito con modalità diverse da quelle indicate.

COLTURE PROTETTE

• Barbabietola da Zucchero

Parassiti combattuti: Insetti del terreno: *Melolontha*, *Grillotalpa*, *Atomaria*; Fitofagi fogliari: *Altica*, *Pegomya*, *Afid*; Nottuidi: *Mamestra*, *Agronis caradrina*.

Nematodi: incistati (*Heterodera*), liberi e galligeni (*Ditylenchus*, *Meloidogyne*).

Miriapodi: *Blaniulus guttulatus*.

Dosi d'impiego: localizzato, per una difesa totale alla dose di 20 kg/Ha. In caso di forte infestazione di nematodi (*Heterodera*), usare 30-40 kg/Ha localizzati 2-3 cm lateralmente alla linea del seme.

Epoca d'impiego: alla semina della coltura. Il trattamento esercita un controllo dei principali fitofagi per circa 50-60 giorni fino allo stadio di 4-6 foglie vere.

Metodi d'impiego: alla dose normale d'impiego, applicare il prodotto durante la semina, localizzato al livello dei glomeruli sul fondo del solchietto di semina, esclusivamente con un distributore di granuli montato sulla seminatrice. Nella necessità di dover impiegare 30-40 kg/Ha di prodotto localizzato, si consiglia di applicarlo lateralmente al seme ad una distanza di 2-3 cm. Interrare poi il prodotto contemporaneamente al seme.

Incorporazione nel terreno: dopo l'incorporazione nel terreno è opportuno effettuare un'irrigazione per asperzione. Evitare di ripetere l'irrigazione per almeno 72 ore e non eccedere nei quantitativi d'acqua nelle irrigazioni successive.

Prima del trattamento si raccomanda di controllare la taratura dell'apparecchio distributore.

ATTENZIONE: il prodotto va impiegato esclusivamente con mezzi meccanici. Effettuare un unico trattamento al momento della semina.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITÀ: Usare il prodotto da solo.

FITOTOSSICITÀ: alle dosi di 30-40 kg/Ha, si consiglia di distanziare di 2-3 cm il prodotto dal seme per evitare un ritardo iniziale di vegetazione.

RISCHI DI NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Impiegarlo una sola volta all'anno al momento della semina o al trapianto delle colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

DA NON VENDERSI SFUSO

03A11466