

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 luglio 2003 *GU n. 177 del 1-8-2003*)

Applicazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva vamidothion che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria
degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il vamidothion, nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento, che stabilisce la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive entro il 25 luglio 2003;

Visto l'art. 2, comma 3, del suddetto regolamento, che stabilisce per l'Italia la possibilita' di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di vamidothion per il controllo degli organismi nocivi su pomacee (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detto impiego;

Considerato che tutti i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva vamidothion attualmente autorizzati in Italia erano gia' autorizzati per gli impieghi ora ritenuti essenziali e che per essi le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta di mantenimento;

Ritenuto di dover attuare il citato regolamento comunitario, procedendo al mantenimento in vigore delle registrazioni dei prodotti fitosanitari contenenti vamidothion elencati nell'allegato A al presente decreto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, e' fissato al 31 dicembre 2003 il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio delle confezioni dei prodotti fitosanitari contenenti vamidothion di cui all'allegato A che riportano in etichetta usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 3, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, e' fissato entro il 31 dicembre 2007 il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari che sono elencati nell'allegato A al presente decreto e che sono stati sottoposti al l'adeguamento delle etichette per gli usi ora ritenuti essenziali;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su pomacee (usi essenziali) dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva vamidothion non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva vamidothion, riportati nell'allegato A al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 giugno 2007 limitatamente al solo impiego su pomacee (usi essenziali) e in conformita' alle condizioni indicate nelle rispettive etichette riportate in allegato B al presente decreto.

Art. 3.

1. Sono consentiti fino al 31 dicembre 2003 la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti vamidothion, limitatamente alle confezioni che riportano in etichetta usi diversi da quelli essenziali indicati nell'ultima colonna del citato allegato A.

2. E' fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti vamidothion, di cui all'allegato A al presente decreto, che sono stati sottoposti all'adeguamento delle etichette per gli usi ora ritenuti essenziali.

3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi delle limitazioni e delle nuove condizioni di impiego fissate per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato A, nonche' del rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal 26 luglio 2003.

Roma, 22 luglio 2003

Il direttore generale: Marabelli

Allegato A

PRODOTTI A BASE DI VAMIDOTHION LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO PROROGATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU POMACEE (USI ESSENZIALI)

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa	Usi essenziali in etichetta
Kilval	002780	29 aprile 1978	Bayer cropscience S.r.l.	melo, pero
Vamik	009671	7 luglio 1998	Scam S.r.l.	melo, pero
Vamiter	009770	1° ottobre 1998	Terranalisi S.r.l.	pomacee


ETICHETTE DEI PPFF DELL'ALLEGATO A

Vedere allegato alle pagg. 21 - 22 - 23 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO B

ETICHETTE DEI PPFF DELL'ALLEGATO 4

<p>Kilval</p> <p>Affida sistemico con azione acaricida secondaria</p> <p>Partita n.: *</p>  <p>TOSSICO</p>	
<p>Composizione</p> <p>g 100 di prodotto contengono:</p> <p>g 37,5 di Vamidozin puro (= 401,25 gr)</p> <p>Coformulanti q.b. a 100</p> <p>Contiene CICLOESANONE</p>	<p>Frasi di Rischio:</p> <p>Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle</p> <p>Infermiabile</p>
<p>Consigli di Prudenza:</p> <p>Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini</p> <p>Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande</p> <p>Non respirare i vapori</p> <p>Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego</p> <p>Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati</p> <p>Non distarsi dal prodotto e dal recipiente se non con le dovute precauzioni</p> <p>Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle</p> <p>In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone</p> <p>In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)</p> <p>Usare indumenti protettivi e guanti adatti</p>	<p>Titolare dell'Autorizzazione:</p> <p>Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 - 20156 MILANO</p> <p>Officine di Produzione:</p> <p>Agrifomula S.r.l., Paganica (AQ)</p> <p>Bayer CropScience France, Elbeuf - Francia</p> <p>Registrazione n. 2780 Ministero della Sanità del 29/4/1978</p> <p>Contenuto netto: 1 l - 5 - 10</p> <p>IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO</p>

COMPATIBILITA'

Non miscelare con sostanze alcaline (polligita bordolese, polisolfuri, permanganato di potassio).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alla persona ed agli animali.

Attenzione: della elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

DA NON VENDERSI SFUSO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

Norme Precauzionali:

Non operare contro vento

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e la terminazione parasimpatica, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscolari (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miopia. Salivazione e sudorazione.

Bradicardia (costante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.

Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni casi

fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono

provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito

spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di

atropizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveneni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto è un insetticida sistemico dotato di una persistenza superiore a tre settimane (e molto spesso a quattro o cinque settimane).

MELIO PERO:

contro tutti gli afidi, in particolare afide lanigero, contro ragnetti rossi,

difetti cecidomidi e cicadelle: 125 ml/l d'acqua con pompe irroratrici a

volume normale; con atomizzatori a basso volume aumentare la dose

in rapporto alla minor quantità di acqua impiegata.

Diluire la quantità sopra indicata di prodotto in pochi litri di acqua.

Versare in seguito, sempre agitando, nella botte della pompa

irroratrice precedentemente riempita d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

— 21 —

VAMIK

INSETTICIDA SISTEMICO CON SPICCATA AZIONE AFICIDA
LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Vamidotion puro g 37,5 (= 401,25 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100
(contiene Cicloesanone)

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.

Il prodotto è tossico per l'uomo e per l'ambiente. Evitare l'uso in aree protette e in prossimità di abitazioni.

Il prodotto è tossico per l'uomo e per l'ambiente. Evitare l'uso in aree protette e in prossimità di abitazioni. Il prodotto è tossico per l'uomo e per l'ambiente. Evitare l'uso in aree protette e in prossimità di abitazioni. Il prodotto è tossico per l'uomo e per l'ambiente. Evitare l'uso in aree protette e in prossimità di abitazioni.


**Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

SCAM S.r.l. - Strada Bellaria, 164 - Modena

Stabilimento di Produzione: SCAM S.r.l. - Modena

Registrazione n. 9671 del 07/07/1998 del Ministero della Sanità

L 1 / 5



TOSSICO

Partita n.:

Il prodotto è tossico per l'uomo e per l'ambiente. Evitare l'uso in aree protette e in prossimità di abitazioni. Il prodotto è tossico per l'uomo e per l'ambiente. Evitare l'uso in aree protette e in prossimità di abitazioni.

Il prodotto è tossico per l'uomo e per l'ambiente. Evitare l'uso in aree protette e in prossimità di abitazioni. Il prodotto è tossico per l'uomo e per l'ambiente. Evitare l'uso in aree protette e in prossimità di abitazioni. Il prodotto è tossico per l'uomo e per l'ambiente. Evitare l'uso in aree protette e in prossimità di abitazioni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: (dosi per 100 litri d'acqua)

VAMIK è un insetticida sistemico che agisce per ingestione. Assorbito rapidamente dalle foglie, si diffonde all'interno della pianta con movimento acropeto arrivando a colpire anche i parassiti protetti dagli accartocciamenti fogliari e non direttamente raggiunti dal trattamento. Dotato di notevole persistenza d'azione (generalmente superiore alle 3 settimane) può svolgere la sua azione anche a temperature relativamente basse. Può essere utilizzato per la protezione delle seguenti colture: **Melo, Pero:** contro tutte le specie di Afidi (*E. lanigerum*, *A. pomi*, *R. insertum*, *D. reamuri*, *M. piraria*, *Dysaphis spp.*, ecc.) 125 ml/h. Intervenire, dalla fase di post-floritura in poi, alla prima comparsa dei parassiti. Per un controllo efficace di *Disaphis spp.* e *Aphis spp.* è consigliabile trattare a caduta petali. Contro *Cecidomia (Desineura spp.)* 125-150 ml/hl, intervenendo a caduta petali. Contro *Tentredine (M. abbreviatus)* 100-125 ml/hl trattando a caduta petali quando risultano infestati almeno il 5% dei mazzetti floreali. Contro *Cicaline (E. rosae, ecc.)* 100-125 ml/hl.

VAMIK svolge inoltre, alle dosi sopra indicate, un'eccellente azione collaterale nei confronti di Acari ed Eriofidi.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': non miscelare con sostanze alcaline (poltiglia bordolese, polisolfuri, permanganato di potassio). **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per animali domestici, insetti utili, pesci e bestiame. Il prodotto tal quale contiene sostanza molto tossica per gli organismi acquatici.

INTERVALLO DI SICUREZZA che deve essere osservato fra l'ultimo trattamento e la raccolta: 60 giorni.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Non miscelare con sostanze alcaline. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

*Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle; *non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore; *non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

*ATTENZIONE: il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

**AFICIDA-INSETTICIDA SISTEMICO
CON AZIONE SECONDARIA SUGLI ACARI
FORMULAZIONE: CONCENTRATO EMULSIONABILE**

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
Vamidozon puro g 37,5 (gr 402)
Coadiuvanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

TOSSICO

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. Via IV Novembre n. 19/1, Renazzo di Cento (FE) - CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE) - SCAM S.R.L. Via Bellaria n. 164, Modena - S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A., Via Pian D'Aseo, Torrenieri, Fraz. di Montalcino (SI)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9770 del 01/10/1998
CONTENUTO: ml 100-200-500 litri 1-5-10-15

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Riferimento partita:

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
VAMITER è un insetticida sistemico con persistenza d'azione di oltre tre settimane, rapidamente assorbito dalle foglie e distribuito in tutta la pianta riuscendo a colpire anche i fitofagi in posizione riparata e, per la sua persistenza, a proteggere i giovani germogli in crescita.

culture	parassiti	dosaggio acqua
POMACEE	Afidi, ragetti rossi (acari), ditteri, cecidomidi e cicaline	ml 125

03A08932