

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 dicembre 2004 (GU n. 16 del 21-1-2005)

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Lumax».

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 19 dicembre 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima del 9 marzo 2004, dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Lumax» contenente le sostanze attive S-metolachlor, mesotrione, terbutilazina;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 29 luglio 1998 «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva S-metolachlor nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del 26 novembre 2003 concernente l'inclusione di alcune sostanze attive, tra cui mesotrione, nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e limitare la validita' della stessa al tempo determinato in anni tre, a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'Ufficio del 9 dicembre 2004, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota pervenuta il 15 dicembre 2004 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, e' autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LUMAX, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle condizioni stabilite per la sostanza attiva terbutilazina al termine della sua revisione comunitaria.

L'autorizzazione e' subordinata anche all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva S-metolachlor in allegato 1 della direttiva 91/414/CEE, unitamente ad eventuali condizioni di utilizzazione, nonche' all'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti a livello nazionale, senza pregiudizio per l'iter di registrazione.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Syngenta Agro S.A.S. - Aigues-Vives (Francia), Syngenta South Africa (Pty) Limited (South Africa), Safapac Ltd - Whittlesford, Cambridge (Uk), nonche' formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l., in Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000.

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12482.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2004

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

-----> Vedere Allegato a pag. 43 della G.U. <-----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

syngenta

LUMAX®

Erbicida selettivo
di pre- e post-emergenza precoce per il mais
Emulsione sospensiva

Composizione:
Mesotrone puro g 3,39 (37,5 g/l)
S-metolachlor g 28,23 (312,5 g/l)
terbutilazina g 16,94 (187,5 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100



NOCIVO

Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi

Altamente tossico per gli organismi
acquatici, può provocare a lungo
termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non distarsi dal prodotto e del recipiente se non con le dovute
precauzioni.

In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli
il contenitore o l'etichetta.

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede

informativa in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.,

Via Gallarate, 139 - MILANO

Stabilimento di produzione:

SYNGENTA AGRO S.A.S. Aigues-Vives (France)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. **1**

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Altre taglie: 15, 10, 120

Altri stabilimenti: SYNGENTA South Africa (Pty) Limited (South Africa)

SAFAPAC LTD. - WHITTLESFORD, CAMBRIDGE (UK)

Stabilimento di confezionamento:

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

NORME PRECAUZIONALI

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi facilmente.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consigli, interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

LUMAX è un erbicida selettivo di pre emergenza e di post emergenza precoce del mais attivo contro graminacee e dicotiledoni. Agisce per assorbimento attraverso il coleoptile e l'ipocotile, ascrivendo radicale e fogliare.

CAMPO D'IMPIEGO, EPOCA E DOSI DI APPLICAZIONE**MAIS**

Epoca di applicazione
Pre emergenza di cultura ed infestanti e in post-emergenza molto precoce della cultura (2-3 foglie) su infestanti appena emerse (infestanti graminacee entro le prime 2 foglie e infestanti dicotiledoni entro le 4 foglie).

Dosi di applicazione

PRE-EMERGENZA: 3,5 - 4,5 litri per ettaro

4 litri per ettaro (nella generalità dei casi).

3,5 litri per ettaro su terreni sabbiosi.

4,5 litri per ettaro in presenza di Sorghum halepense da seme

POST-EMERGENZA PRECOCE: 3 - 4 litri per ettaro, con avvertenza di

utilizzare la dose minore su terreni sabbiosi.

LUMAX si distribuisce impiegando 300-500 litri di acqua; può essere

applicato con irroratori a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio per

assicurare un'uniforme distribuzione ed una buona copertura del bersaglio.

INFESTANTI SENSIBILI

Echinochloe crus-galli (Giovane comune), *Digitaria sanguinalis* (Digitaria),

Setaria viridis (Setaria), *Panicum dichotomiflorum* (Giovane ambricano),

Poa annua (Fienarola), *Poa trivialis* (Fienarola comune), *Sorghum*

halepense (origano da seme) (Sorghetto da seme), *Oryza sativa* (Riso

codice), *Scirpus maritimus* (Cipollino), *Ambrosia artemisiifolia* (Cancro molla),

Astilbe virginica (Acalifa), *Amaranthus hybridus* (Amaranto ibrido),

Amaranthus lividus (Amaranto livido), *Amaranthus retrofractus* (Amaranto

comune), *Anagallis arvensis* (Anegallide), *Barbarea* spp. (Barbarea),

Bidens bipartita (Forbicina), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore

comune), *Chenopodium minus* (Linaria minore), *Chenopodium album*

(Fainaccio), *Datura stramonium* (Stramonio), *Fumaria officinalis* (Fumaria

comune), *Gallinsoga parviflora* (Gallinsoga), *Hiliscus tiliaceus* (Bisco

vescovoso), *Kickxia elatine* (Linaria), *Lamium purpureum* (Falsa orlica

purpurea), *Mentha canonicum* (Camomilla comune), *Medicago lupulina*

(Erba medica lupulina), *Oxalis* spp. (Acetosella), *Papaver rhoeas*

(Papavero comune), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum*

convolvulus (Convolvolo), *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso),

Polygonum persicaria (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana),

Senecio vulgaris (Senecione comune), *Sisyrinchium angustifolium* (Zucchino

salvatico), *Solanum nigrum* (Erba Morella), *Stellaria media* (Stellaria),

Taraxacum officinale (Dente di leone), *Veronica persica* (Veronica)

AVVERTENZE

• Eseguire le applicazioni di pre-emergenza su terreno di preferenza già umido o che verrà bagnato entro la prima due settimane dal trattamento da pioggia o irrigazioni. Le eventuali sarchiature eseguite dopo il trattamento devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non contenente l'erbicida.

• Il trattamento, se effettuato in post emergenza della coltura, deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo; non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua, siccità. Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme e mais dolce.

• Post-emergenza precoce: I geoinsetticidi a base di terbufos e forate, distribuiti in precedenza all'applicazione di Lumax, possono interferire con il normale sviluppo del mais, così come si possono verificare interferenze con insetticidi carbammati e fosforici utilizzati in miscela con Lumax.

• Versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura.

• Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Non conservare nella botte la soluzione pronta per il trattamento (es. durante la notte).

• Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.

• Al termine della applicazione di Lumax è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura con una soluzione di acqua ed idoneo detergente.

• Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere che la vegetazione sia asciutta.

• In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

• Nel caso di forata asessina, è possibile riseminare mais.

• Adoperare guanti durante la fase di miscelazione, tutta e guanti durante l'applicazione.

FOTOTOSSICITA'

Alcuni giorni dopo il trattamento di post emergenza precoce si possono manifestare sulla coltura alcuni sintomi transitori rappresentati da decolorazioni o imbracchimenti fogliari, che non hanno conseguenze sullo sviluppo e la produzione del mais. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: il formulato contiene sostanze attive nocive per gli artropodi utili.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso

nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Smaltire secondo le norme vigenti

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE

LE ISTRUZIONI PER L'USO

05A00412