

## MINISTERO DELLA SALUTE

**DECRETO 8 agosto 2006 (GU n. 195 del 23-8-2006)**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cimoter 30 WP», registrato al n. 11817.**

IL DIRETTORE GENERALE  
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 ottobre 2004 e successiva integrazione del 18 aprile 2006 dall'impresa Terranalisi S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Cimoter 30 WP uguale al prodotto di riferimento denominato Oxacim registrato al n. 11846 con D.D. in data 30 settembre 2003 dell'impresa Europhyto T.S.A. S.r.l. con sede in Bergamo;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Cimoter 30 WP è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza

attiva Cimoxanil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2008 l'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara) via Nino Bixio, 6, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato Cimoter 30 WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g 100-200-250-500 e kg 1-5-10, nonche' in sacchetti idrosolubili da kg. 1 (n. 10 da g 100; n. 5 da g 200; n. 4 da g 250; n. 2 da g 500).

Il prodotto in questione e' preparato anche in sacchetti idrosolubili presso gli stabilimenti delle imprese:

Adica S.r.l. - Nera Montoro (Terni) autorizzato con decreti del 2 luglio 1975/12 novembre 2003;

Chemia S.p.a. S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;

Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997;

Torre S.r.l. - Torrenieri - Montalcino (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003;

Terranalisi S.r.l. Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987/24 gennaio 1997 con esclusione per i sacchetti idrosolubili.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 11817.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere immagini da pag. 7 a pag. 10 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO


ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

**CIMOTER 30 WP**

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO CITOTROPICO - POLVERE BAGNABILE

**CIMOTER 30 WP**

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono

CIMOXAN L puro g 30  
Coformulanti q. b. a g 100FRASI DI RISCHIO - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. -  
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti  
negativi per l'ambiente acquatico.CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare  
lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumaredurante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare incuranti protettivi  
e guanti adatti. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e  
mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono  
essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicu-  
rezza.

IRRITANTE

Pericoloso  
per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6636207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / A.D.I.C.A. S.R.L. - Via dello  
Stabilimento n. 11 - Nera Montoro (TR) / CHEMIA SPA - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / S.T.I. SOLFOTECNICA  
ITALIANA S.p.a. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA) / TORRE S.P.A. - Via Pian d'Asso - Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)  
Registrazione del Ministero della Salute n. de

Riferimento partita N.:

CONTENUTO: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Cimoxan (derivato dell'urea) - Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché  
irritazione della gola e della cute. L'ingestione può provocare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati stitichezza ed ematuria. Te-  
rapia: Sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.**CARATTERISTICHE**CIMOTER 30 WP è un fungicida antiperonosporico dotato di attività preventiva e curativa. Agisce per contatto sulle spore germinanti e per  
via citotropica-translaminare all'interno dei tessuti sul micelio nei primi stadi di sviluppo.

Assorbito entro 6 ore dal trattamento, presenta un effetto residuo limitato entro 4-6 giorni dall'intervento.

**DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO**CIMOTER 30 WP può essere utilizzato da solo o in associazione a fungicidi di copertura, quali di-carbammati o prodotti rameici. In caso  
di miscela la dose d'impiego può essere ridotta tenendo comunque presente che la quantità di CIMOTER 30 WP distribuita non deve  
essere inferiore a 400 grammi per ettaro di superficie.

CIMOTER 30 WP si impiega sulle colture seguenti:

VITE: contro Peronospora della vite (*Plasmopora viticola*) alla dose di 60-75 g/ha in interventi preventivi a partire dalle prime condizioni favorevoli  
all'infezione e sino a fine fioritura. Dalla fase di allegazione e sino a chiusura grappoli, intervento in miscela con prodotti di copertura  
riducendo la dose a 40-60 g/ha.POMODORO, MELONE, PATATA, TABACCO, CARCIOFO, CIPOLLA, PISELLO, LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINO, AGLIO, PORRO,  
GIRASOLE, SOIA e ROSA: contro Peronosporacee (*Phytophthora infestans*, *Phytophthora porri*, *Bremia lactucae*, *Peronospora lanuginosa*,  
*Peronospora pisi*, *Peronospora sclerotiorum*, *Peronospora mansuetica*, *Pseudoperonospora cubensis*, *Plasmopora halimifolia*, *Peronospora la-*  
*bacina*, *Peronospora sparsa*) alla dose di 60-75 g/ha in interventi preventivi dal manifestarsi delle prime condizioni favorevoli all'infezione.  
Ripetere gli interventi in funzione dell'andamento climatico.In caso di infezioni in atto, eseguire due trattamenti ravvicinati alla dose più alta. E' possibile ridurre la dose d'impiego a 30-35 g/ha se si ef-  
fettuano trattamenti in miscela a fungicidi di contatto tenendo comunque presente che la quantità di CIMOTER 30 WP distribuita non deve  
essere mai inferiore a 400 grammi per ettaro di superficie.

COMPATIBILITA' - Il prodotto non è miscelabile con prodotti a reazione alcalina (es. polisolfuri e poltiglia bordolese) ed olii minerali.

AVVERTENZE - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate  
e norme precauzionali previste per i prodotti più tossici, qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione  
compilata.**INTERVALLO DI SICUREZZA**

Vite, Pomodoro, Melone, Patata, Tabacco, Cipolla, Pisello, Lattuga, Spinacio, Zucchini, Aglio, Porro: 10 gg

Carciofo: 21 gg

Soia, Girasole: 28 gg

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali  
danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trat-  
tamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO


NON OPERARE CONTRO VENTO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN  
PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE  
DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

**CIMOTER 30 WP**

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO CITOTROPICO - POLVERE BAGNABILE

<p><b>CIMOTER 30 WP</b>  <b>COMPOSIZIONE</b> - 100 grammi di prodotto contengono:          CIMOXANIL puro                   g 30          Coformulanti                   q.b. a   g 100</p>			
<p><b>FRASI DI RISCHIO</b> - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.  <b>CONSIGLI DI PRUDENZA</b> - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.</p>			
<p> <b>TERRANALISI S.R.L.</b> - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6636207</p>		<p><b>IRRITANTE</b></p>	<p><b>Pericoloso per l'ambiente</b></p>
<p>Registrazione del Ministero della Salute n.                   del          Riferimento partita N.:</p>		<p>CONTENUTO: g 100</p>	

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "

OPPURE:


" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

COPIA TRATTA DA GURITEL

Etichetta per confezione contenente sacchetti idrosolubili

**CIMOTER 30 WP**contiene sacchetti  
idrosolubili

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO CITOTROPICO - POLVERE BAGNABILE

<p><b>CIMOTER 30 WP</b>  <b>COMPOSIZIONE</b> - 100 grammi di prodotto contengono:          CIMOXANIL puro g 30          Coformulanti q.b. e g 100</p> <p><b>FRASI DI RISCHIO</b> - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. -          Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti          negativi per l'ambiente acquatico.</p> <p><b>CONSIGLI DI PRUDENZA</b> - Conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare          lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare          durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi          e guanti adatti. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e          mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono          essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicu-          rezza</p> <p> <b>TERRANALISI S.R.L.</b> - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207          Stabilimento di produzione: A.D.I.C.A. S.R.L. - Via dello Stabilimento n. 11 - Nera Montoro (TR) / CHEMIA SPA -          Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / S.T.I. SCLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola          (RA) / TORRE S.r.l. - Via Pian d'Asso - Torrenieri (raz. di Montaluno - St)          Registrazione del Ministero della Salute n. del          Riferimento partita N.: <b>CONTENUTO: Kg 1 (n. 10 s.i. da g 100; n. 5 s.i. da g 200; n. 4 s.i. da g 250; n. 2 s.i. da g 500)</b></p>	 <b>IRRITANTE</b>	 <b>Pericoloso per l'ambiente</b>
--	--	---

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO** - Cimoxanil (derivato dell'urea) - Sirtomi. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazioni della gola e della cute. L'ingestione può provocare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati cubitero ed ematuria. Terapia: Sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

**CARATTERISTICHE** - CIMOTER 30 WP è un fungicida antiperonosporico dotato di attività preventiva e curativa. Agisce per contatto sulle spore germi nati e per via citotropica-translocinaria all'interno dei tessuti sul micelio nei primi stadi di sviluppo. Assorbito entro 6 ore da trattamento, presenta un effetto residuo limitato entro 4-6 giorni dall'intervento.

**DOSE E MODALITÀ DI IMPIEGO**

CIMOTER 30 WP può essere utilizzato da solo o in associazione a fungicidi di copertura, quali difiocarbammati o prodotti rameici in caso di miscela la dose d'impiego può essere ridotta, tenendo comunque presente che la quantità di CIMOTER 30 WP distribuita non deve essere inferiore a 400 grammi per ettaro di superficie.

CIMOTER 30 WP si impiega sulle colture seguenti:

**VITE:** contro *Peronospora* della vite (*Plasmopora viticola*) alla dose di 60-75 g/ha in interventi preventivi a partire dalle prime condizioni favorevoli all'infezione e sino a fine fioritura. Dalla fase di allegagione e sino a chiusura grappoli, intervenire in miscela con prodotti di copertura riducendo la dose a 40-60 g/ha.

**POMODORO, MELONE, PATATA, TABACCO, CARCIOFO, CIPOLLA, PISELLO, LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINO, AGLIO, PORRO, GIRASOLE, SOIA e ROSA:** contro *Peronosporaceae* (*Phytophthora infestans*, *Phytophthora pom*, *Brennia lactuca*, *Peronospora farinosa*, *Peronospora pisi*, *Peronospora schiodeni*, *Peronospora manshurica*, *Pseudoperonospora cubensis*, *Plasmopora nelsonii*, *Peronospora tabacum*, *Peronospora sparsa*) alla dose di 60-75 g/ha in interventi preventivi dai manifestarsi delle prime condizioni favorevoli all'infezione. Ripetere gli interventi in funzione dell'andamento climatico.

In caso di infezioni in atto, eseguire due trattamenti ravvicinati alla dose più alta. È possibile ridurre la dose d'impiego a 30-35 g/ha se si effettuano trattamenti in miscela a fungicidi di contatto tenendo comunque presente che la quantità di CIMOTER 30 WP distribuita non deve essere mai inferiore a 400 grammi per ettaro di superficie.

**COMPATIBILITÀ** - Il prodotto non è miscelabile con prodotti a reazione alcalina (es. solforati e poligali bordolese) ed altri minerali.

**AVVERTENZE** - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**INTERVALLO DI SICUREZZA**

Vite, Pomodoro, Melone, Patata, Tabacco, Cipolla, Pisello, Lattuga, Spinacio, Zucchino, Aglio, Porro: 10 gg

Carciofo: 21 gg

Soia, Girasole: 28 gg





Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI; SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO - NON OPERARE CONTRO VENTO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.**

**DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE - DA SCIogliere IN ACQUA SENZA ROMPERE**

**MODO D'UTILIZZO**

Questa confezione  
contiene sacchetti  
idrosolubili.




Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. **STOCCAGGIO** - Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

**CIMOTER 30 WP**

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO CITOTROPICO - POLVERE BAGNABILE

<p><b>CIMOTER 30 WP</b>  <b>COMPOSIZIONE</b> - 100 grammi di prodotto contengono:  <b>CIMOXANIL</b> puro                   g 30          Coformulanti                   g, b, a   g 100</p>		
<p><b>FRASI DI RISCHIO</b> - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.  <b>CONSIGLI DI PRUDENZA</b> - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.</p>		
<p> <b>TERRANALISI S.R.L.</b> - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6636207</p>		<p><b>IRRITANTE</b>                   <b>Pericoloso per l'ambiente</b></p>
<p>Registrazione del Ministero della Salute n.                   del          Riferimento partita N.:</p>		<p><b>CONTENUTO: g 100</b></p>

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "

OPPURE:

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

06A07891