

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 agosto 2006 (GU n. 207 del 6-9-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Coccifos», registrato al n. 13141.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 10 febbraio 2006 dall'impresa Chimac Agriphar S.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Coccifos» uguale al prodotto di riferimento denominato «Supreme» registrato al n. 12103 con decreto direttoriale in data 16 febbraio 2004 dell'impresa Chimac Agriphar con sede in Ougree (Belgio);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Supreme» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Coccifos» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno

stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Clorpirifos e Cipermetrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 16 febbraio 2009, l'impresa Chimac Agriphar S.A. con sede in Rue de Renory, 26 B-4102 Ougree - Belgio, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato COCCIFOS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 20-25-50-100-250-500 e litri 1-2-3-5.

Il prodotto in questione e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa: LIFA S.r.l. ubicato in Vigonovo (Venezia) autorizzato con decreti del 1° agosto 1978/11 luglio 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13141.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato da pag. 8 a pag. 10 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in trattamenti precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie e penetri all'interno delle stesse. Il prodotto si impiega sulle seguenti colture:

ARANCIO, LIMONE: contro: Afidi, Aleurodidi, Dialeurodidi, Mosca degli agrumi, Cocciniglia (neanidi) alla dose di 180-240 ml/ha; contro: Formiche alla dose di 600 ml/ha, inorando il terreno con 10 litri di acqua.
MELO, PERO: contro: Afidi alla dose di 150-240 ml/ha intervenendo su foglie non accartocciate; contro: Ricaricari, Carpocapsa, Lepidotteri, Cocciniglia alla dose di 200-300 ml/ha; contro: Pella in trattamenti di fine inverno alla dose di 210 ml/ha. In interventi su uova mature all'apparizione delle prime neanidi di prima generazione alla dose di 300 ml/ha; contro: Afidi alla dose di 150-220 ml/ha intervenendo su foglie non accartocciate; contro: Cocciniglia, Tripidi, Mosca alla dose di 220-300 ml/ha; contro: Cidia, Anarsia e Lepidotteri in genere alla dose di 220-300 ml/ha.

VITE: contro: Tignole alla dose di 150-180 ml/ha alla prima comparsa delle larve; contro: Cocciniglia, Sigaraio, Cicadine alla dose di 150-180 ml/ha.

SOIA: contro: Cricchi e Lepidotteri fogliari alla dose di 3-3,5 l/ha
MAIS: contro: Afidi alla dose di 1,8-2,4 l/ha; contro: Piralide e Sesamia alla dose di 2,4 - 3 l/ha
BARBIETOLA DA ZUCCHERO: contro: Afidi alla dose di 1,2-1,5 l/ha; contro: Ussio e Cleono alla dose di 2 - 2,5 l/ha; contro: Notte alla dose di 1,8 - 2,5 l/ha.

TABACCO: contro Afidi, Mosca bianca alla dose di 180-240 ml/ha; contro Notte e Tripidi alla dose di 240-300 ml/ha.

PIOPPO: contro Afidi alla dose di 180-240 ml/ha; contro Saperda e Cipterifino alla dose di 250-350 ml/ha.

CIPOLLA, PATATA, PISELLO, POMODORO: contro Afidi, Aleurodidi, Cricchi, Piralide, Dorifora, Cavolaia, Notte, Tripidi, Mosca alla dose di 2-2,5 l/ha.

COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, VIVAI (in pieno campo): contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tortricidi alla dose di 180-240 ml/ha.

Terrino destinato alla coltura di CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLFIORE: contro Notte, Cavolaia ed altri Lepidotteri alla dose di 2,5-3,3 l/ha.

COMPATIBILITÀ: il prodotto non è miscelabile con antiparassitari a reazione alcalina; in caso di miscela con polveri bagnabili eseguire una preventiva diluizione del prodotto in acqua, prima di eseguire la preparazione della poltiglia.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici: qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI INOCUITÀ: il prodotto è tossico per gli insetti utili.

FITOTOSSICITÀ: Su agrumi non trattare nei mesi compresi tra Gennaio ed Aprile.

INTERVALLO DI SICUREZZA. Sospendere i trattamenti prima della raccolta delle seguenti colture:
 Soia: 120 gg. / Arancio, Limone, Tabacco, Barbietola da zucchero: 60 gg. / Pero, Melo, Vite, Pesca, Mais, Patata: 30 gg. / Pomodoro, Cipolla: 21 gg. / Pisello, 15 gg.


ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA; OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle precedenti istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Prima di entrare nelle aree trattate attendere l'accoppiatura della vegetazione. Per lavorazioni agricole successive al trattamento, da effettuarsi entro i tempi di carenza, indossare guanti ed indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SECONDO LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

COCCIFOS

INSETTICIDA MICROINCAPSULATO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
 100 grammi di prodotto contengono:
 Clorpirifos puro g 16 (=159,7 g/l)
 Clorpirifos puro g 1,5 (= 15,9 g/l)
 Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
 Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale è il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specificate sulle informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scarico delle acque delle aziende agricole e delle strade

Titolare della registrazione:
CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée - BELGIO

Distribuito da: **KOLLANT S.p.A. - Via Trieste, 49/53 - 35127 Padova / AZF Agricoltura S.r.l. - Via Libsona, 7 - 35127 Padova / VERDE VIVO S.r.l. - P.zza Pietrara, 7 - 35137 Padova**

Stabilimento di produzione: **L.F.A. S.r.l. - Via C. Colombo 7/7A - 30030 Vigonovo (VE)**

Registrazione del Ministero della Salute n. del Partita n°
 Contenuto netto: **ml 20-25-50-100-250-500-1.1-2-3-5**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
 Trattamento di soppressione delle seguenti sostanze attive: Clorpirifos (15% e Clorpirifos 1,5% in quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: Clorpirifos: Sintomi: colicose il SNC e le terminazioni periferiche; le allarghe, pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi: intossicazione (di prima intossicazione) nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, iperventilazione bronchiale, alterazioni polmonari. Visione offuscata, miopia. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (riscossione). Sintomi respiratori (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, iperventilazione, bradicardia. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Chiusi di notte, genuinamente inefficaci respiratori. Alcuni vasi (belforo), a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un affetto neurologico: ritardo, garbato, flecila, in seguito a questo, nelle "escentia" Clorpirifos: Sintomi: possono le trasmissioni nervose, bruciando, bruciando, bruciando, le terminazioni nervose. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ad alcuni, nonché da bambini. Sintomi: a carico del SNC: vertigini, convulsioni, atassia, inibizione delle vie nervose, miopia, (falso) bruciamento e disipne. Reazioni allergiche: vasculiti, angioedema, ipertensione, sudorazione, epimi cutanei, collaggio vascolare periferico.

N.B. Diluanti e coformulanti idrocarburici possono provocare broncospasmi cliniche, aritmie cardiache, tosse, sincope e di funzione.

Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: COCCIFOS è un insetticida liquido microincapsulato ad ampio spettro d'azione. Agisce per contatto e per ingestione contro larve ed adulti di numerosi fitofagi. La formulazione in microcapsule migliora le caratteristiche di protezione e persistenza di azione ostacolando la reintossicazione.

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO PER LE TAGLIE DA ml 20 - 25 - 50 - 100

COCCIFOS	
Insetticida microincapsulato ad ampio spettro d'azione	
COMPOSIZIONE	
100 g di prodotto contengono:	
Clorpirifos puro	g 16 (=159,7 g/l)
Cipermetrina pura	g 1,5 (= 15,9 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100
FRASI DI RISCHIO	
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.	
CONSIGLI DI PRUDENZA	
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognaie - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade)	
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	
CHIMAC AGRIPHAR S.A.	
Rue de Renory, 26 - B 4102 Ougree (Belgio)	
Distribuito da:	
KOLLANT S.p.A. - Via Trieste, 49/53 - 35121 Padova	
AZF Agricoltura S.r.l. - Via Lisbona, 7 - 35127 Padova	
VERDE VIVO S.r.l. - P.zza Petrarca, 7 - 35137 Padova	
Registrazione del Ministero della Salute n. del	
Contenuto netto: ml 20-25-50-100	
Partita n.	
PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE	

FOGLIO ILLUSTRATIVO

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale, il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in trattamenti precoci e prima che l'insetto provochi l'accartocciamento delle foglie o penetri all'interno delle stesse. Il prodotto si impiega sulle seguenti colture:

ARANCIO, LIMONE: contro: Afidi, Aleurodidi, Dialeurodidi, Mosca degli agrumi, Cocciniglie (neanidi) alla dose di 180-240 ml/ha; contro: Formiche alla dose di 600 ml/ha, irrorando il terreno con 10 l/ha di acqua.

MELO, PERO: contro: Afidi alla dose di 150-240 ml/ha intervenendo su foglie non accartocciate; contro: Ricinidi, Carpocapsa, Lepidotteri, Cocciniglie alla dose di 200-300 ml/ha; contro: Palla in trattamento di fine inverno alla dose di 210 ml/ha; in interventi su uova mature all'apparire della prima neanidi di prima generazione alla dose di 300 ml/ha; contro: Mosca della mela alla dose di 1,5 - 2,5 l/ha.

PESCO: contro: Afidi alla dose di 150-220 ml/ha intervenendo su foglie non accartocciate; contro: Cocciniglie, Tripidi, Mosca alla dose di 220-300 ml/ha; contro: Odia, Anarsia e Lepidotteri in genere alla dose di 220-300 ml/ha.

VITE: contro: Tignole alla dose di 150-180 ml/ha alla prima comparsa delle larve; contro: Cocciniglie, Sigaro, Cicale alla dose di 150-180 ml/ha.

SOIA: contro: Cimici e Lepidotteri fogliari alla dose di 3-3,5 l/ha.

MAIS: contro: Afidi alla dose di 1,8-2,4 l/ha; contro: Firalide e Sesamia alla dose di 2,4 - 3 l/ha.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro: Altica alla dose di 1,2-1,5 l/ha; contro: Lisso e Cebono alla dose di 2 - 2,5 l/ha; contro: Notte alla dose di 1,8 - 2,4 l/ha.

TABACCO: contro Afidi, Mosca bianca alla dose di 180-240 ml/ha; contro Notte e Tripidi alla dose di 240-300 ml/ha.

PIOPPO: contro Afidi alla dose di 180-240 ml/ha; contro Superda e Cratichne alla dose di 250-350 ml/ha.

GIPOLLA, PATATA, PISELLO, POMODORO: contro Afidi, Aleurodidi, Cimici, Piralide, Dorifera, Cavolaia, Notte, Tripidi, Mosca alla dose di 2-2,5 l/ha.

COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, VIVAI (in pieno campo): contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tortricidi alla dose di 180-240 ml/ha.

Tenere destinato alla coltura di **CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLFIORE**, contro Notte, Cavolaia ed altri Lepidotteri alla dose di 2,5-3,3 l/ha.

COMPATIBILITÀ: il prodotto non è miscibile con antiparassitari a reazione alcalina: in caso di miscela con polveri bagnabili eseguire una preventiva diluizione del prodotto in acqua, prima di eseguire la preparazione della poltiglia.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici: qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per gli insetti utili.

FITOTOSSICITÀ: Su agniti non trattare nei mesi compresi tra Gennaio ed Aprile.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti prima della raccolta delle seguenti colture: Scia: 120 gg. / Arancio, Limone, Tabacco, Barbabietola da zucchero: 60 gg. / Pero, Melo, Vite, Pesco, Mais, Patato: 30 gg. / Pomodoro, Cipolla: 21 gg. / Pisello: 15 gg.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento o per evitare danni alla pianta, alla persona e agli animali.

Prima di rientrare nelle aree trattate attendere l'asciugatura della vegetazione. Per lavorazioni agricole successive al trattamento, da effettuarsi entro i tempi di carenza, indossare guanti ed indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE ALIMENTI, BEVANDE E CONTENITORI DI ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

COCCIFOS

INSETTICIDA MICROINCAPSULATO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

COCCIFOS

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Clorpirifos puro g 15 (=150,7 g/l)

Cipermetrina pura g 1,5 (= 15,9 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE



Titolare della registrazione:

CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Rue de Renory, 25 B-4102 Ougrée - BELGIO

Distribuito da: KOLLANT S.p.A. - Via Trieste, 49/53 - 35121 Padova / AZF Agricoltura S.r.l. - Via

Lisbona, 7 - 35127 Padova / VERDE VIVO S.r.l. - P.zza Ferrara, 7 - 35137 Padova

Stabilimento di produzione: L.I.F.A. S.r.l. - Via C. Colombo 7/17A - 30030 Vigonovo (VE)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: ml 20-25-50-100-250-500-1-1-2-3-5

Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattato di associazione dello spettro: estensione attivo: Clorpirifos: 15% e Cipermetrina: 1,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: Clorpirifos: Sintomi colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi periferiche, le placche neuromuscolari, Sintomi muscolari (di prima comparsa) nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, bruciore, ipersudorazione, bruciore, vertigine, polmonite, Valproil, cefalea, miopia, Salivazione e sudorazione, Bradicardia (irregolarità), Sintomi muscolari (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia, ipertensione arteriale, fibrillazione, Sintomi centrali: convulsioni, coma. Cause di morte: sindrome da ipertensione, provocata da un effetto neurologico. Alcuni esseri umani, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono manifestare respirazione, Alcuni esseri umani (pazienti) possono, in seguito, sviluppare, delle "estremità", Cipermetrina: Sintomi: bloccare la trasmissione nervosa, per il blocco dei recettori, per il blocco delle terminazioni nervose, Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ad amari; nonché dei bambini, Sintomi: a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irradiazione delle vie aeree: insonnia, tosse, broncospasmo a dispendio, reazioni allergiche scarse, anafilassi, ipertensione, sudorazione, edemi oculari, collasso, vasodilatazione.

N.B. Gli effetti a proporzioni (dicrocanti) possono provocare broncospasmi, cefalea, aritmia cardiaca.

Terapia: Sintomatica e di rianimazione.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: COCCIFOS è un insetticida liquido microincapsulato ad ampio spettro d'azione. Agisce per contatto e per ingestione contro larve ed adulti di numerosi fitofagi. La formulazione in microcapsule migliora le caratteristiche di protezione e persistenza di azione ostacolando la reinfestazione

06A08167