

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 febbraio 2007 (*GU n. 57 del 9-3-2007- Suppl. Ordinario n.64*)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Forza», registrato al n. 13560.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194, e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 10 ottobre 2006 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Forza» uguale al prodotto di riferimento denominato «Karate Xpress» registrato al n. 8259 con decreto direttoriale in data 4 maggio 1993 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Karate Xpress» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Forza» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo

l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Lambda-cialotrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011 l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede in via Gallarate, 139 - Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «nocivo pericoloso per l'ambiente» denominato FORZA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g 10-50-100-250-500 e kg 1-5 anche in sacchetti idrosolubili nelle taglie da: kg 1 (5x200g) - kg 1 (2x500g) g 20 (1x20g) - g 100 (1x100g) - g 500 (5x100g).

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

STI Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997;

Torre S.r.l. Torrenieri-Montalcino (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003 nonche' confezionati presso gli stabilimenti delle imprese:

Scam S.p.A. S. Maria di Mugnano (Modena) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990;

Isagro S.p.A. Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto registrato al n. 13560.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 7 febbraio 2007

Il direttore generale: Borrello

----> Vedere Allegato da pag. 17 a pag. 24 del S.O. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

syngenta

FORZA®

Insetticida in granuli idrosospensibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
 lambda-cialotrina pura
 coformulanti q.b. a

g 2,5
 g 100



NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione
 Irritante per gli occhi e la
 pelle

Può provocare
 sensibilizzazione per
 contatto con la pelle



PERICOLOSO

PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e
 mostrargli il contenitore o l'etichetta
 Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti
 come rifiuti pericolosi.
 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni
 speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.

Via Gallarate, 139 - Milano

Stabilimento di produzione:

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n.

del

Partita n.

kg 1

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccare la trasmissione nervosa, paralizzando pre-pulsi
 soprattutto le terminazioni nervose.

Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici,
 nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, iniezione
 delle vie aeree, rinite, tosse, broncospasmo e dispnea, reazioni
 allergiche acutizzate, anafilassi, peritemie, suppurazione, edemi
 cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapie: sintomatiche e di rianalisi.

Consultare un Centro Antiveneni.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Nocivo per gli insetti utili.

Non trattare in fioritura.

Divieto di impiego in serra.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Finocchio, favenello, carota, zucchini, aglio, porro, cipolla,
 lentischia, fagiolo, peperone, melanzana, pomodoro: 3 giorni.
 Arancio, pesco, albicocco, ciliegio, susino, melo, pero, fragola,
 actinidia, ribes nero, uva spina, lampone, mandorlo, nocciolo,
 barbabietola da zucchero, cavoli a infiorescenza (cavolfiore, cavolo
 broccolo), cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, cicoria,
 radicchio, sedano, cetriolo, fava, fagiolo, pisello, erba medica: 7
 giorni.

Mais, patata, colza, ravizzone, soia, luppolo, arachide, cotone, prati,
 pascoli, mais da foraggio, fieno e barbabietola da foraggio: 15
 giorni.

Vite: 21 giorni.

Frumento, orzo, avena, segale, sorgo: 30 giorni.

Tabacco: 60 giorni.

Girasole: 70 giorni.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro
 uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli
 eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere
 rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere
 osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
 Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico
 della miscelazione compiuta.

Altro stabilimento di produzione:

TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Stabilimenti di confezionamento:

S.C.A.M. S.p.A., S. Maria di Mugnano (MO)
 ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)

Altre taglie:

g 10; g 50; g 100; g 250; g 500; kg 5

CARATTERISTICHE

FORZA è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro
 d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per
 contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto
 repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità
 di principio attivo. FORZA unisce un rapido potere abbattente ad
 una persistente capacità protettiva. La particolare formulazione in
 granuli idrosospensibili riduce la formazione di polveri o vapori.

MODALITÀ DI IMPIEGO

FORZA si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi
 stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un
 regolare monitoraggio delle colture da difendere. FORZA si disperde
 in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (200-700 l/ha)
 ed alto (700-1000 l/ha) volume. E' importante assicurare una
 uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il
 contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi
 maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande
 sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del
 trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed
 un idoneo detergente.

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente
 introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento
 piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le
 floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua
 innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

Da non applicare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi
 d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere
 disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
 Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque
 di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di
 scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
 SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

syngenta

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Le dosi sottoindicate sono espresse in g/100 lt d'acqua e vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. Per l'intervento su nottue, da effettuarsi a pieno campo, le dosi sono espresse per unità di superficie (g/ha). Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.

Cultura	Parassiti	Dosi (g/100 lt)
Arancio	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Cocciniglie (neanidi)	100 - 160
	Mosca, cimice verde	60 - 100
Pesco	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Mosca della frutta	60 - 100
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100 - 160
Albicocco	Tripidi	50 - 80
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Ciliegio, susino	Mosca della frutta	60 - 100
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Melo, pero	Mosca della frutta	60 - 100
	Afidi (foglie non accartocciate)	50 - 80
	Cemiosoma, litocolle (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1ª generazione), carpocapsa	60 - 100
	Picamatrici estive e lepidotteri	80 - 100
Fragola	Psilla del pero:	80 - 100
	1ª intervento (adulti svernanti)	80 - 100
	2ª intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio	100 - 140
Actinidia e fruttiferi minori (ribes nero, uva spina, lampone)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Lepidotteri tortricidi	80 - 100
Mandorlo, nocciolo	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Agrillo (adulti e forme larvali esterne), maggiolino (sulla vegetazione)	80 - 100
Vite	Tignola e tignoletta:	100 - 120
	1ª generazione	120 - 160
	2ª generazione	100 - 160
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	60 - 100
	Cicaline	60 - 100
	Sigaro	100 - 120

Attenzione:

- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto.

Cultura	Parassiti	Dose (g/100 lt)
Ortaggi (vedere nota a fondo tabella)	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	40 - 60
	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	60 - 80
	Cimici	80 - 100
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Patata	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Dorifora	60 - 80
Barbabietola da zucchero	Africa	60 - 80
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Cleono, lisso	80 - 100
Cereali (frumento, orzo, avena, segale, sorgo)	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrella	60 - 80
	Piralide	80 - 100
	Nottue (allo scoperto)	400-500 g/ha
Mais	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrella	60 - 80
	Piralide, Diabrotica virgifer virgifer	80 - 100
	Nottue (allo scoperto)	400-500 g/ha
Oleagifere (arachide, girasole, colza, ravizzone, coltore)	Afidi (foglie non accartocciate), alica, meligete e tentredine	60 - 80
	Cimici e cecidomia	80 - 120
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Luppolo	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Foraggere (prati-pascoli, loglio, mais, barbabietola da foraggio, erba medica)	60 - 120
Tabacco	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi e mosca bianca	40 - 60
	Tripidi e pulce del tabacco	60 - 80
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Fioreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Tripidi	60 - 80
	Baga del garofano (su larva prima che penetri)	100 - 120
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Forestali	Afidi	60 - 80
	Processionaria (forme migranti)	60 - 80
	Tingide americana	80 - 100
	Lepidotteri defogliatori	60 - 100

Ortaggi: cavoli a infiorescenza (cavolfiore, cavolo broccolo), cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, cicoria, radicchio, sedano, finocchio, zuccino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, taglio, tagolino, pisello, fava, lentichia, rapanello, carola, aglio, cipolla, porro.

Nota: nel caso del carciofo non superare la dose massima di 600 g/ha

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Le dosi sotto indicate sono espresse in g/100 lt d'acqua e vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale.

Per l'intervento su notte, da effettuarsi a pieno campo, le dosi sono espresse per unità di superficie (g/ha). Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, raggiungere un idoneo bagnante.

Cultura	Parassiti	Dosi (g/100 lt)
Arancio	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Cocciniglie (neanidi)	100 - 160
	Mosca, cimice verde	60 - 100
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Mosca della frutta	60 - 100
Pesco	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100 - 160
	Tripidi	60 - 80
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Mosca della frutta	60 - 100
Albicocco	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Mosca della frutta	60 - 100
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Mosca della frutta	60 - 100
Ciliegio, susino	Afidi (foglie non accartocciate)	60 - 80
	Cerniosoma, lilocollate (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1 ^a generazione), carpocapsa	60 - 100
	Ricamatrici estive e lepidotteri	80 - 100
	Psilla del pero:	80 - 100
	1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2 ^a gen.) normalmente in maggio	100 - 140
Fragola	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Lepidotteri torricoli	80 - 100
Actinidia e frutiferi minori (ribes nero, uva spina, lampone)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Agrioli (adulti e forme larvali esterne), maggiolino (sulla vegetazione)	80 - 100
	Tignola e tignoletta:	100 - 120
	1 ^a generazione	120 - 160
	2 ^a generazione	100 - 160
Mandarino, nocciolo	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	60 - 100
	Cicaline	100 - 120
Vite	Sinocrino	100 - 120

Attenzione:

- Attenzione.**
- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
 - Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
 - In presenza di andamento climatico anomalo, specie poco niole e infestazioni ai ci fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
 - Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti prubiti all'area trattata e cio per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
 - Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

Cultura	Parassita	Dose (g/100 lt)
Ortaggi (vedere nota a fondo tabella)	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	40 - 60
	Dorifora, cavolista, tripidi, piralidi	60 - 80
	Cimici	80 - 100
Patata	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Barbabietola da zucchero	Dorifora	60 - 80
	Alica	60 - 80
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Cereali (frumento, orzo, avena, segale, sorgo)	Cleone, lisso	80 - 100
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idralia	60 - 80
Mais	Piralide	80 - 100
	Nottue (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idralia	60 - 80
Oleaginose (arachide, grasole, colza, ravizzone, cotone)	Piralide, Diabrotica virgifera virgifera	80 - 100
	Nottue (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi (foglie non accartocciate), alica, meligete e tentidine	60 - 80
Soia	Cimici e cecidomia	80 - 120
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Luppolo	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	F'oreggere (prati-pàccoli, foglio, mais, barbabietola da foraggio, erba medica)	60 - 120
Tabacco	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi e mosca bianca	40 - 60
	Tripidi e pulce del tabacco	60 - 80
Floreali ed ornamentali	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Tripidi	60 - 80
Forestali	Bega del garofano (su larve prima che penetino)	100 - 120
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi	60 - 80
	Processionaria (forme migranti)	60 - 80
	Tingide americana	80 - 100
	Lepidotteri defogliatori	60 - 100

Ortaggi: cavoli a infiorescenza (cavolfiore, cavolo broccolo), cavolo cappuccio, cavolfiori di Bruxelles, carciofo, cicoria, radicchio, sedano, finocchio, zucchini, cetirio, pomodoro, peperone, melanzana, tagliolo, taggolino. **Insalate:** tava, lenticchia, rapanello, carota, aglio, cipolle, porro.

Nota: nel caso del carciofo non superare la dose massima di 600 g/ha.

syngenta**FORZA[®]****Insetticida in granuli idrosospensibili in sacchetti idrosolubili****COMPOSIZIONE**

100 g di prodotto contengono:
lambda-cialotrina pura g 2,5
coformulanti q.b. a g 100

**NOCIVO****PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Syngenta Crop Protection S.p.A
Via Gallarate, 139 - MILANO

Registrazione Ministero della Salute n. del

g 20 – 50 – 100 – 200 - 500

Da sciogliere in acqua senza rompere.

Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione.



FORZA[®]

Insetticida in granuli idrosospensibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
 lambda-cialotrina pura g 2,5
 coformulanti q.b. a g 100



NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle



**PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
 Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – Milano

Stabilimento di produzione:
 S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. del
Partita n.

g 50

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
 Il contenitore non può essere riutilizzato

FOGLIO ILLUSTRATIVO

syngenta

FORZA[®]

Insetticida in granuli idrosospensibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
 lambda-cialotrina pura
 coformulanti q.b. a

g 2,5
 g 100



NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione
 Irritante per gli occhi e la pelle
 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle



Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
 Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
 Via Gallarate, 139 - Milano

Stabilimento di produzione:

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n.

g 50

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccare la trasmissione nervosa ipersensibilizzando pre-esistentemente le terminazioni neuronali.

Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, intorpidimento delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea, reazioni allergiche: eritemi, anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Consultare un Centro Antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Nocivo per gli insetti utili.

Non trattare in fioritura.

Divieto di impiego in serra.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Finocchio, favenello, carota, zuccino, aglio, porro, cipolla, lenticchia, fagiolo, peperone, melanzana, pomodoro: 3 giorni.
 Arancio, pesco, albicocco, ciliegio, susino, melo, pero, fragola, actinidia, ribes nero, uva spina, lampone, mandarino, nocciolo, barbabietola da zucchero, cavoli a infiorescenza (cavolfiore, cavolo broccolo), cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, cicoria, radicchio, sedano, cetriolo, fava, fagiolo, pisello, erba medica: 7 giorni.

Mais, patata, colza, ravizzone, soia, luppolo, arachide, cotone, prati, pascoli, mais da foraggio, foglio e barbabietola da foraggio: 15 giorni.

Vite: 21 giorni.

Frumento, orzo, avena, segale, sorgo: 30 giorni.

Tabacco: 60 giorni.

Girasole: 70 giorni.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Altro stabilimento di produzione:

TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Stabilimenti di confezionamento:

S.C.A.M. S.p.A., S. Maria di Mugnano (MO)
 ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)

Altra taglia: g 10

CARATTERISTICHE

FORZA è un nuovo insetticida folostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. FORZA unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. La particolare formulazione in granuli idrosospensibili riduce la formazione di polveri o vapori.

MODALITÀ DI IMPIEGO

FORZA si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. FORZA si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (200-700 lt/ha) ed alto (700-1000 lt/ha) volume. È importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

Da non applicare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

syngenta

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Le dosi sottostimate sono espresse in g/100 lt d'acqua e vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale.

Per l'intervento su notte, da effettuarsi a pieno campo, le dosi sono espresse per unità di superficie (g/ha). Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.

Cultura	Parassiti	Dosi (g/100 lt)
Arancio	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Cocciniglie (neanidi)	100 - 160
	Mosca, cimice verde	60 - 100
Pesco	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Mosca della frutta	60 - 100
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120
Albicocco	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100 - 160
	Tripidi	60 - 80
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Cileglio, susino	Mosca della frutta	60 - 100
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Melo, pero	Mosca della frutta	60 - 100
	Afidi (foglie non accartocciate)	60 - 80
	Cemicostoma, litocolle (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1ª generazione), carpocapsa	60 - 100
Fragola	Ricamatrici estive e lepidotteri	80 - 100
	Psilla del pero:	80 - 100
	1° intervento (adulti svernanti)	100 - 140
Actinidia e fruttiferi minori (ribes nero, uva spina, lampone)	2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.)	40 - 60
	normalmente in maggio	80 - 100
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Mandorlo, nocciolo	Lepidotteri torrefici	80 - 100
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Agrillo (adulti e forme larvali esterne), maggiolino (sulla vegetazione)	90 - 100
Vite	Tignola e tignoletta:	100 - 120
	1ª generazione	120 - 160
	2ª generazione	100 - 160
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	60 - 100
	Cicaline	60 - 100
	Sigarato	100 - 120

Attenzione:

- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco nota e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

Cultura	Parassiti	Dose (g/100 lt)
Ortaggi (vedere nota a fondo tabella)	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	40 - 60
	Dorifera, cavolaia, tripidi, piralidi	60 - 80
	Cimici	80 - 100
Patata	Notte defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Dorifera	60 - 80
Barbabietola da zucchero	Africa	60 - 80
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Cleono, lisso	80 - 100
Cereali (frumento, orzo, avena, segale, sorgo)	Notte defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	60 - 80
	Piralide	80 - 100
Mais	Notte (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	60 - 80
	Piralide, Diabrotica virgifer virgifer	80 - 100
Oleaginose (arachide, girasole, colza, ravizzone, cotone)	Notte (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi (foglie non accartocciate), allica, meligete e tentredine	60 - 80
	Cimici e cecidomia	80 - 120
Sola	Notte defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Luppolo	Foraggiere (pial-pascoli, loglio, mais, barbabietola da foraggio, erba medica)	60 - 120
	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonoma	400-500 g/ha
	Notte defogliatrici (allo scoperto)	40 - 60
Tabacco	Afidi e mosca bianca	40 - 60
	Tripidi e pulce del tabacco	60 - 80
	Notte defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Tripidi	60 - 80
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	100 - 120
Forestali	Notte defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
	Afidi	60 - 80
	Processionaria (forme migranti)	60 - 80
	Tingide americana	80 - 100
	Lepidotteri defogliatori	60 - 100

Ortaggi: cavoli a infiorescenza (cavolfiore, cavolo broccolo), cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, cicoria, radicchio, sedano, finocchio, zuccino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolino, pisello, fava, lentichia, rapanello, carota, aglio, cipolla, porro.

Nota: nel caso del carciofo non superare la dose massima di 600 g/ha