MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 settembre 2006 (*GU n. 225 del 27-9-2006*)
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Hexon 5 SC», registrato al n. 13176.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 1° marzo 2006 dall'impresa «Genetti GmbH/S.r.l.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Hexon 5 SC» uguale al prodotto di riferimento denominato «Esacon 50» registrato al n. 11618 con decreto direttoriale in data 5 marzo 2003 dell'impresa «Guaber S.p.A.» con sede in Funo (Bologna);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato «Esacon 50» dell'impresa «Guaber S.p.A.»;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Hexon 5 SC» e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo

l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Esaconazolo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa «Genetti GmbH/S.r.l.» con sede in via Parini, 4/A Merano (Bolzano) e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo denominato «Hexon 5 SC» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 100-500 e litri 1-5.

Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'impresa estera: Simonis - Doentinchem - Olanda.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13176.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 15-16 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

HEXON 5 SC

Fungicida ad azione sistemica
Sospensione Concentrata

HEXON 5 SC
COMPOSIZIONE
- Esaconazolo g. 4,6 (= 50 g/lt)
- Coformulanti qb a 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, bevande e da mangimi. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Richiedere le istruzioni speciali/schede informative di sicurezza

Genetti GmbH / S.r.l.
Via Parmi, 4/A - 39012 Merano (BZ)

Officina di produzione :
Simonis – Doentinchem – Olanda

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx del Ministero della Salute

Taglie : ml 100 – 500 litri 1 – 5 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi, organi interessati: occhi, cute, mucose, tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca rinite, broncospasmo e dispnea per irritazione congiuntivale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per somministrazioni di alte dosi. Sono possibili tubulonefrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è completamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CAMPO D'IMPIEGO
Fungicida ad azione sistemica e translaminare che penetra rapidamente attraverso i tessuti della pianta sfuggendo all'azione dilavante della pioggia. La sua azione nei confronti dei patogeni è di tipo preventivo, curativo ed eradicante. Non favorisce lo sviluppo degli acari e non influisce sulla fermentazione dei mosti e sulle caratteristiche organolettiche dei vini.
Intervenire sulle colture in modo tempestivo nel momento in cui sono sensibili ad attacchi fungini, con cadenza di 10 – 14 giorni (per le pomacee cadenza dei trattamenti ogni 6-8 giorni), con volumi di acqua medio–alti: 600 – 2000 litri ettaro con completa ed uniforme bagnatura della vegetazione da trattare.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
indicato l'impiego (dosaggi per q.le acqua) :
- **melo e pero**: contro Ticchiolatura e Oidio a ml 50.
- **vite**: contro Oidio e Black rot (Guignardia), su uve da vino a ml 35-40 e su uve da tavola a ml 40-50;
- **carciofo e pomodoro**: contro l'Oidio a ml 30 – 40.
- **rosa, zinnia e astri**: contro Oidio e Ticchiolatura, a ml 50 - 100

COMPATIBILITA' : Miscibile con fungicidi ad attività protettiva (Captano, Clorotalonil, Ditianon, Metiram, Mancozeb, Maneb, Bupirimate, Zolfo) e con gli insetticidi Cipermetrina e Pirimicarb.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': sulle varietà di melo Macintosh e relativi incroci impiegare solo fino alla fioritura; miscele con clorotalonil possono provocare ruggginosità su Golden delicious e Granny smith.
Sospendere i trattamenti: 15 giorni per melo, pero e vite, 7 giorni per le altre colture.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

COPIA NON UFFICIALE

Etichetta / Foglietto illustrativo

HEXON 5 SC

Fungicida ad azione sistemica
Sospensione Concentrata

HEXON 5 SC
COMPOSIZIONE
- Esaconazolo g. 4,8 (= 50 g/lt)
- Coformulanti qb a 100



NOCIVO

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Genetti GmbH / S.r.l.
Via Parini, 4/A - 39012 Merano (BZ)

Officina di produzione :
Simonis – Doentinchem – Olanda

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx del Ministero della Salute

Taglie : ml 100 Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

TRATTO DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE

06A08590