MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2006 (*GU n. 1 del 2-1-2007- Suppl. Ordinario n.1*)
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Jackal», registrato al n. 13416.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 3 agosto 2006 dall'impresa Green Ravenna S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Jackal uguale al prodotto di riferimento denominato Nuclear registrato al n. 12191 con decreto direttoriale in data 6 giugno 2006 dell'impresa Agrosol S.r.l. con sede in Ravenna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato Nuclear dell'impresa Agrosol S.r.l. con sede in Ravenna;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Jackal e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno

stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Teflubenzuron;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 giugno 2011 l'impresa Green Ravenna S.r.l., con sede in via Matteotti n. 16, Ravenna, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato Jackal con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 10-20-25-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Scam S.p.a. - Modena - autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990;

Chemia S.p.a. - S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;

I.R.C.A. Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001;

Terranalisi S.p.a. - Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987/24 gennaio 1997 nonche' confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13416.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> vedere allegato da pag. 9 a pag. 10 del S.O. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

JACKAL

Insetticida

Sospensione Concentrata

Partita n.:"
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:

Teflubenzuron puro .....g 13,57 (= 150 g/l)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene Formurea: può provocare una reazione allergica

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Officine di Produzione :
SCAM S.p.A.– Modena
CHEMIA S.p.A.– S. Agostino (FE)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE)

Officina di confezionamento:
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto :
ml 10 – 20 – 25 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500;
litri 1 – 5 – 10 – 20 – 25 – 50

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

JACKAL è un regolatore di crescita degli insetti, che inibisce lo sviluppo delle forme larvali di diversi fitofagi interferendo sul processo di sintesi della chitina. Le larve colpite dal trattamento interrompono la loro attività trofica, morendo durante la muta. JACKAL è un insetticida sistemico ed esplica la propria attività prevalentemente per ingestione. Nei confronti di alcune specie di insetti manifesta attività ovicida. JACKAL è attivo nei confronti di un vasto numero di fitofagi appartenenti agli ordini dei Lepidotteri, Coleotteri, Imenotteri (Tentredini) ed Emitteri (Psilla piri). Il preparato è selettivo nei confronti di diversi artropodi utili quali Antocoridi, Coccinellidi, Sirfidi, Afelinidi e Fitoseidi.

CAMPI D'APPLICAZIONE E DOSI D'IMPIEGO

- Melo e Pero
  Contro Minatori fogliari : Leucoptera scitella (Cemiostoma), Phyllonorycter blancardella e Corylifolella (Litocollete) 30-40 ml/hl (0,6-0,8 l/ha); eseguire il trattamento circa 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti. Contro Laspeyresia pomonella (Carpocapsa) 30-50 ml/hl (0,6-1 l/ha); eseguire l'applicazione contro la prima generazione circa 8-10 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti. Si consiglia di seguire attentamente lo sfarfallamento, facendo uso delle trappole feromoniche. L'intervento contro la seconda generazione si effettua circa 30-40 giorni dopo il primo trattamento. Nei casi di prolungato volo degli adulti prevedere un'ulteriore terza applicazione circa 30-40 giorni dopo il secondo intervento.
  Contro Cydia molesta (Tignola orientale) 30-50 ml/hl (0,6-1 l/ha); effettuare 1-2 trattamenti a partire dalla prima-seconda decade di agosto.
  Contro Psylla Piri 50 ml/hl (1 l/ha). Il prodotto combatte le neanidi di prima e seconda età. Nella lotta contro la Psilla, effettuando 2-3 trattamenti a giugno e luglio, si ottiene ottima attività collaterale contro Zeuzera pyrina.
- Nettarine e Pesco
  Contro minatori fogliari (Phyllonorycter pomonella) 30-40 ml/hl (0,6-0,8l/ha); eseguire il trattamento circa 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti.
  Contro Cydia molesta (Tignola orientale) 30-40 ml/hl (0,6-0,8 l/ha); trattare all'inizio di ogni sfarfallamento secondo monitoraggio con trappole a feromoni.
- Vite
  Contro Lobesia botrana (Tignoletta dell'uva) 40 - 50 ml/hl (0,8-1 l/ha); effettuare il trattamento circa 8-10 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti. In caso di elevato grado di infestazione, ripetere il trattamento 10-14 giorni dopo il primo intervento. Si consiglia di impiegare il Teflubenzuron solo contro la seconda generazione.
- Patata e Melanzana
  Contro Dorifora (Leptinotarsa decemlineata) 150 ml/ha; effettuare il trattamento contro larve di prima e seconda età (sebbene il prodotto sia attivo contro tutti gli stadi larvali).
- Peperone
  Contro Piralide (Ostrinia nubialis) 50 ml/hl (0,5 l/ha); effettuare il trattamento nel periodo di piena ovideposizione, prima della schiusura delle uova, distribuendo un quantitativo di poltiglia pari a 10 ettolitri per ettaro.
- Mais (da granella)
  Contro Piralide (Ostrinia nubialis) 1 l/ha; effettuare un trattamento per generazione, prima della penetrazione delle larve negli stocchi.
- Cavoli
  Contro Mamestra (Mamestra brassicae) e Cavolaia (Pieris sp.) 150-200 ml/ha; eseguire il trattamento sulle larve nella fase di sviluppo.
- Ornamentali
  Contro Hyphantria cunea 50 ml/hl; bagnare il più possibile ed in modo omogeneo le chiome
- Terriccio di fungaia
  Contro Lycorella sp. 4 ml sciolti in 2,5 litri di acqua per metro quadro di terriccio; applicare la poltiglia sul terriccio da proteggere.

Compatibilità :

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti pi tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Per le piante ornamentali si consigliano saggi preliminari.

Rischi di Nocività : Si consiglia di evitare applicazioni durante il periodo della fioritura per evitare danni alle api; si raccomanda , immediatamente prima del trattamento, di sfalciare le infestanti in fioritura eventualmente presenti.

Sospendere i trattamenti:
7 giorni prima della raccolta per i cavoli
10 giorni prima della raccolta per melanzana e peperone
14 giorni prima della raccolta per melo e pero
21 giorni prima della raccolta per pesco e nettarine
28 giorni prima della raccolta per vite, patata e mais
45 giorni prima della raccolta per i funghi

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

JACKAL

Insetticida

Sospensione Concentrata

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:

Teflubenzuron puro .....g 13,57 (= 150 g/l)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene Formurea: può provocare una reazione allergica

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

green

Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Officine di Produzione :
SCAM S.p.A.– Modena
CHEMIA S.p.A.– S. Agostino (FE)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE)

Officina di confezionamento:
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 10 – 20 – 25 – 50 – 100

Informazioni mediche: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Compatibilità :
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : Per le piante ornamentali si consigliano saggi preliminari.

Rischi di Nocività : Si consiglia di evitare applicazioni durante il periodo della fioritura per evitare danni alle api; si raccomanda , immediatamente prima del trattamento, di sfalciare le infestanti in fioritura eventualmente presenti.

Sospendere i trattamenti:
7 giorni prima della raccolta per i cavoli
10 giorni prima della raccolta per melanzana e peperone
14 giorni prima della raccolta per melo e pero
21 giorni prima della raccolta per pesco e nettarine
28 giorni prima della raccolta per vite, patata e mais
45 giorni prima della raccolta per i funghi

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A11933

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE