

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 giugno 2006 (GU n. 147 del 27-6-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pencor Combi», registrato al n. 12250.

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 15 giugno 2004 dall'Impresa Terranalisi S.r.l., con sede legale in via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Pencor Combi»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive penconazolo - zolfo;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 13 settembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'impresa:

Terranalisi S.r.l. - via N. Bixio, 6 - Cento (Ferrara);

Zolfindustria S.r.l. - via Cantarana, 17 - San Cipriano Po (Pavia);

Chemia S.p.a. - Strada Statale, 255 Km 46 - San Agostino (Ferrara);

STI Solfotecnica italiana S.p.a. - via Evangelista Torricelli, 2
- Cotignola (Ravenna);
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Terranalisi S.r.l., con sede legale in via Nino Bixio, 6, Cento (Ferrara) e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato PENCOR COMBI con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 100-200-250-500 e Kg 1-5-10-15-20.

3. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti dell'impresa:

Zolfindustria S.r.l. - via Cantarana, 17 - San Cipriano Po (Pavia), autorizzato con decreti del 23 giugno 1981 e 4 ottobre 2004;

Chemia S.p.a. - Strada Statale, 255 Km 46 - San Agostino (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;

STI Solfotecnica italiana S.p.a. - via Evangelista Torricelli, 2 - Cotignola (Ravenna), autorizzato con decreti del 19 giugno 1982 e 22 dicembre 1997;

Terranalisi S.r.l., via N. Bixio, 6 - Cento (Ferrara), autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987 e 24 gennaio 1997.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12250.

5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato da pag. 57 a pag. 58 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

PENCOR COMBI

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA E BLOCCANTE
TIPO DI FORMALAZIONE: POLVERE BAGNABILE

PENCOR COMBI

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

PENCONAZOLO puro	g	1,5
ZOLFO puro (esente da Selenio)	g	40
Coformulanti q.b. a		100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. - Proteggersi gli occhi/la faccia.



TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207


Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / ZOLFINDUSTRIA S.R.L. - Via Cantarana n. 17 - San Cipriano Po (PV) / CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2 - Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Salute n.

del

Riferimento partita N.:

CONTENUTO: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10-15-20



IRRITANTE

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi e organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. - Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). - Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. - Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico - in caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C.. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO - Fungicida sistemico e di contatto impiegato sia come preventivo che curativo e come bloccante; viene rapidamente assorbito all'interno dei tessuti vegetali. Trova applicazione su:

VITE - Oidio (*Uncinula necator*) - Trattamenti preventivi: in pre e post-floritura g 150-200/hl intervenendo ogni 14 giorni, g 100-150/hl effettuando il trattamento ogni 7-10 giorni. PENCOR COMBI possiede azione collaterale contro Eriosi, Guignardia spp e Pseudopeziza spp.

MELO

Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*)

- Trattamenti preventivi: g 200-250/hl ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-12 giorni.

- Trattamenti curativi: g 250-300/hl, si può intervenire entro 96 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.

- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): g 250-300/hl facendo 2 applicazioni ogni 5-7 giorni e poi continuando con le dosi normali.

Oidio (*Podosphaera leucotricha*)

- Trattamenti preventivi: in primavera g 220-250/hl ogni 10 giorni; nei trattamenti estivi ogni 10-14 giorni impiegando le dosi più alte e gli intervalli più brevi su varietà Oidio-sensibili.

- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): g 200-230/hl ogni 7 giorni per un totale di 3-4 applicazioni.

Malattie da conservazione (*Monilia fructigena*, *Penicillium* spp.) - fare in totale 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 340 g/hl.

PESCO (comprese le **NETTARINE** ed **IBRIDI SIMILI**) - Oidio - Trattamenti preventivi: in zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a g. 250-340 hl dalla caduta petali ed ogni 10-14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-21 giorni. **Malattie da conservazione** (*Monilia fructigena*, *Penicillium* spp.) - fare 2-3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 340 g/hl.

TABACCO - Oidio: g 240-340 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.

CARCIOFO - CETRIOLO - MELONE - PEPERONE (applicazione anche in serra) - **PISELLO - POMODORO** (applicazione anche in serra) - **ZUCCHINO - ZUCCA** - Oidio: in pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 12-14 giorni a g 170-340 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI FLOREALI - Oidio e ruggini: g 170-340/hl ogni 10-14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordeaux, ecc.) olii minerali, captano, diclorvos. **Avvertenza** - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvill Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap. Vite: Sangiovese. Cucurbitacee: può essere fitotossico. Irrorare a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato (se la durata dello stesso è inferiore a due anni)

ATTENZIONE: "Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi"

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PENCOR COMBI

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA E BLOCCANTE
TIPO DI FORMALAZIONE: POLVERE BAGNABILE


PENCOR COMBI

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

PENCONAZOLO puro	g	1,5
ZOLFO puro (esente da Selenio)	g	40
Coformulanti q.b. a		100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle**CONSIGLI DI PRUDENZA** - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. - Proteggersi gli occhi/la faccia.**TERRANALISI S.R.L.** - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207Registrazione del Ministero della Salute n.
Riferimento partita N.:

del

**IRRITANTE**

CONTENUTO: g 100

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

06A05878