

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2006 (*GU n. 1 del 2-1-2007- Suppl. Ordinario n.1*)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Rembo», registrato al n. 13508.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 27 giugno 2006 dall'impresa Diachem S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Rembo' uguale al prodotto di riferimento denominato Rembo' SC registrato al n. 12347 con decreto direttoriale in data 14 settembre 2004 dell'impresa I.Q.V. Industrias Quimicas del Valles con sede in Barcellona (Spagna);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Rembo' SC dell'impresa I.Q.V.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Rembo' è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo

l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Teflubenzuron;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 14 settembre 2009 l'impresa Diachem S.p.a., con sede in via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (Bergamo), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato Rembo' con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 25-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13508.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> vedere allegato da pag. 20 a pag. 21 del S.O. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

MODALITÀ D'IMPIEGO

Diluire direttamente in acqua la dose prescritta di prodotto.

CAMPI D'APPLICAZIONE E DOSI D'IMPIEGO**Melo e pero:** contro Minatori fogliari: *Leucophaea scitella* (Ceniosstona), *Phyllobryctes biancardella* e *corisfolia* (Latoscellet) 30-40 ml/ha (0,8 l/ha); eseguire il trattamento circa 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti.Contro *Laspeyresia pomonella* (Carpocapsa) 30-50 ml/ha (0,6-1 l/ha); eseguire l'applicazione contro la prima generazione circa 8-10 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti; si consiglia di seguire attentamente lo sfarfallamento facendo uso delle trappole feromomiche. L'intervento contro la seconda generazione si effettua circa 30-40 giorni dopo il primo trattamento. Nei casi di prolungato volo degli adulti prevedere un'ulteriore terza applicazione circa 30-40 giorni dopo il secondo intervento.Contro *Cydia molesta* (Tignola orientale) 30-50 ml/ha (0,6-1 l/ha); effettuare 1-2 trattamenti a partire dalla 1^a-2^a decade di agosto. Contro *Psylla pyri* 50 ml/ha (1 l/ha); il prodotto combatte nemidi di prima e seconda età. Nella lotta antipsilla, effettuando 2-3 trattamenti a giugno e luglio, si ottiene ottima attività collaterale contro *Zenaidura pruna*.**Nettarie e pesco:** contro Minatori fogliari: (*Phyllobryctes pomonella*) 30-40 ml/ha (0,6-0,8 l/ha); eseguire il trattamento circa 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti.Contro *Cydia molesta* (Tignola orientale) 30-40 ml/ha (0,6-0,8 l/ha); trattare all'inizio di ogni sfarfallamento secondo monitoraggio con trappole a feromoni.**Vite:** contro *Lobesia batrana* (Tignoletta dell'uva) 40-50 ml/ha (0,6 l/ha). Effettuare l'applicazione circa 8-10 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti; in caso di elevato grado di infestazione ripetere il trattamento 10-14 giorni dopo il primo intervento. Si consiglia di impiegare REMBO® solo contro la seconda generazione.**Patata e melanzana:** contro Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*) 150 ml/ha; effettuare il trattamento contro larve di prima e seconda età (sebbene REMBO® sia attivo contro tutti gli stadi larvali).**Pecorone:** contro Piralide (*Ostrinia nubilalis*) 50 ml/ha (0,5 l/ha); effettuare il trattamento nel periodo di piena ovodeposizione, prima della chiusura delle uova, distribuendo un quantitativo di poltiglia pari a 10 ettolitri per ettaro.**Mais da granella:** contro Piralide (*Ostrinia nubilalis*) 1 l/ha; effettuare un trattamento per generazione, prima della penetrazione delle larve negli stocchi.**Cavolo:** contro *Manisstra brassicae* (Mamestra) e *Pieris sp.* (Cavolaia) 150-200 ml/ha; eseguire il trattamento sulle larve in prima fase di sviluppo.**Ornamentali:** contro *Hyphantria cunea* 50 ml/ha; bagnare il più possibile ed in modo omogeneo le chiome.**Terriccio di fungaia:** contro *Lycoriella spp.* (fam. Sclariidi) 4 ml sciolto in 2,5 l/mq di terriccio; applicare la poltiglia sul terriccio da proteggere.**Avvertenza:** si consiglia di evitare applicazioni durante il periodo della fioritura per evitare danni alla covata delle api; immediatamente prima del trattamento con REMBO® si raccomanda di sfalcare le infestanti in fioritura eventualmente presenti.**COMPATIBILITÀ:** Avvertenza - in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di utenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.**FITOTOSSICITÀ:** Per le piante ornamentali sono consigliati saggi preliminari.**INTERVALLO DI SICUREZZA:** sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per cavolo; 10 giorni per melanzana e peperone; 14 giorni per melo e pero; 21 giorni per nettarie e pesco; 28 giorni per vite, patata e mais; 45 giorni per funghi.**Attenzione:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.****Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.****ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON
PRUDENZA****REMBO®**
Insetticida regolativo di crescita
Sospensione concentrata**COMPOSIZIONE**100 g di prodotto contengono:
Teflubenzuron puro g 13,57 (= 150 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100**CONSIGLI DI PRUDENZA**Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)**OFFICINA DI PRODUZIONE**DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n° del

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO ml 25; 50; 100; 200; 250; 500; lt 1, 5, 10, 20

PARTITA N.**NORME PRECAUZIONALI**

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consigli interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE

REMBO® è un regolatore di crescita degli insetti (R.C.I.) che inibisce lo sviluppo dei parassiti interferendo sul processo di sintesi della chitina. REMBO® non è un insetticida sistematico ed esplica la propria attività prevalentemente per ingestione. Nei confronti di alcune specie di insetti manifesta attività ovicida. REMBO® è attivo nei confronti di un vasto numero di fitofagi appartenenti agli ordini dei Lepidotteri, Coleotteri, imenotteri (Tentredini) ed Emittieri (Psylla pin). Il formulato è selettivo nei confronti di diversi artropodi utili, quali Antocoridi, Coccinellidi, Sirfidi, Afelinidi e Fitoseidi.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

REMBÒ Insetticida regolatore di crescita Sospensione concentrata	ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA
COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: Teflubenzuron puro g 13,57 (= 150 g/l) Coformulanti q.b. a g 100	
CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego	
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 ALBANO S.ALESSANDRO (BG)	
OFFICINA DI PRODUZIONE DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA CARAVAGGIO (BG)	
Registrazione Ministero della Salute n° del	
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 25; 50; 100. PARTITA N.	
Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti Il contenitore non può essere riutilizzato Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente	

06A11938