

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 febbraio 2007 (*GU n. 57 del 9-3-2007- Suppl. Ordinario n.64*)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sidecar M Blu», registrato al n. 13545.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194, e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2006 dall'impresa Isagro S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sidecar M Blu» uguale al prodotto di riferimento denominato «Fantic M Blu» registrato al n. 12870 con decreto direttoriale in data 28 settembre 2006 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Fantic M Blu» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Sidecar M Blu» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo

l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Benalaxil-M e Mancozeb;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 settembre 2009 l'impresa Isagro S.p.A., con sede in via Caldera, 21 - Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario ««irritante pericoloso per l'ambiente» denominato SIDECAR M BLU con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 0,2-0,25-0,5-1-5-10-20-25 anche in sacchetti idrosolubili nelle taglie da 0,5(1\times 05) - 0,5(2\times 0,25) - 1(1\times 1) - 1(2\times 0,5) - 1(4\times 0,25) - 1,5(3\times 05) - 1,5(6\times 0,25) - 2,5(1\times 2,5) - 2,5(5\times 0,5) - 2,5(10\times 0,25) - 5(5\times 1) - 5(10\times 0,5) - 5(2\times 2,5) - 8(4\times 2) - 8(8\times 1) - 10(5\times 2) - 10(10\times 1) - 10(20\times 0,5) - 10(4\times 2,5) kg.

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004;

Agriformula S.r.l. - Paganica (L'Aquila) autorizzato con decreti del 26 ottobre 1972/22 settembre 2004;

Isagro S.p.A. Adria Cavanella Po (Rovigo) autorizzato con decreti del 7 ottobre 1977/12 novembre 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13545.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 14 febbraio 2007

Il direttore generale: Borrello

----> Vedere Allegato da pag. 105 a pag. 107 del S.O. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

SIDECAR M BLU è un preparato ad elevata attività antiparassitaria, grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza e in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie delle piante e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.

La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi e Black-rot della vite.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.

VITE

Peronospora (*Plasmopara viticola*): g. 250 per 100 litri di acqua (pari a 2,5 kg/ha).
I trattamenti vanno eseguiti nel periodo compreso fra il verificarsi delle condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e la fase fenologica di sviluppo dei grappoli in cui gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe. I trattamenti vanno eseguiti ad un intervallo di 10-14 giorni. Il primo trattamento va eseguito in ogni caso non più tardi della fase fenologica di differenziazione degli organi fiorali (7-8 foglie). Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

Su questa coltura non effettuare più di 3 interventi nell'arco della stagione.

POMODORO

Peronospora (*Phytophthora infestans*): g. 250 per 100 litri di acqua (pari a 2,5 kg/ha)
Applicazioni in pieno campo a cadenza di 10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

PATATA

Peronospora (*Phytophthora infestans*): g. 250 per 100 litri di acqua (pari a 2,5 kg/ha)
Applicazioni in pieno campo a cadenza di 8-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.
Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare SIDECAR M BLU o altri prodotti contenenti benalaxil-M o fenilamidi per più di 3 volte su patata e pomodoro.

Preparazione della sospensione

Sciogliere il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea, diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DIVIETI DI IMPIEGO

DA NON IMPIEGARE IN SERRA, DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA': il SIDECAR M BLU può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta per la vite e 14 giorni prima delle raccolte per le altre colture.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

DA NON VENDERSI SFUSO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON OPERARE CONTRO VENTO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

SIDECAR® M BLU

FUNGICIDA COLORATO IN POLVERE BAGNABILE, DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, POMODORO E PATATA

COMPOSIZIONE

Benalaxil-M (Methyl-N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-D-alaninate)
puro g. 4
Mancozeb puro g. 65
Dispersidenti, coloranti, bagnanti e supporti inerti q.b. a g. 100

Frasi di rischio (R): Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbriano D-ala 3 - Via Caldera, 21 -

20124 MILANO - Tel. 02 4090111 (centr.) - 02 40901276 (sest. Qualità)

Registrazione Ministero della Salute n° 5 del

DISTRIBUTORE: Isagro Italia S.r.l. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO MI


OFFICINE DI PRODUZIONE: Isagro S.p.A. - Aprilia (LT), Isagro S.p.A. - Adria

Cavanella Po (Rovigo), AgriFormula S.r.l. - Paganica (L'Aquila)


QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25

kg

Partita N°



IRRITANTE



PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Utilizzare guanti durante la miscelazione e il carico; utilizzare tutti stivali, guanti e maschera filtrante con filtro di tipo FF-P1 durante l'applicazione. Utilizzare dispositivi di protezione individuali (guanti, camicia e pantaloni lunghi) per le lavorazioni di rientro.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di: 10 metri per vite; 10 metri per pomodoro allevato con tutore; 5 metri per pomodoro allevato a terra; 5 metri per patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trafasti di associazione delle seguenti sostanze attive:

BENALAXIL-M 4% e MANCOZEB 65%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

BENALAXIL-M - Sintomi: in animali da laboratorio: diapnea e torpore.

MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhi: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatica, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia.

Effetto antibase: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipertensione erostatica. Dopo qualche ora il viso da puerile diventa pallido e l'ipertensione si aggrava fino ad arrivare alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni

La presenza di *Mancozeb* attribuisce al prodotto un effetto collaterale su *Esportati* e *Black soil* della vite.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.

VITE
Peronospora (*Plasmium viticola*): g. 250 per 100 litri di acqua (pari a 2,5 kg/ha).
I trattamenti vanno eseguiti nel periodo compreso tra il verificarsi delle condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e la fase fenologica di sviluppo dei grappoli in cui gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe. I trattamenti vanno eseguiti ad un intervallo di 10-14 giorni. Il primo trattamento va eseguito in ogni caso non più tardi della fase fenologica di differenziazione degli organi fiorali (7-8 foglie). Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

Per questa coltura non effettuare più di 3 interventi nell'arco della stagione.

POMODORO
Peronospora (*Phytophthora infestans*): g. 250 per 100 litri di acqua (pari a 2,5 kg/ha).

Applicazioni in pieno campo a cadenza di 10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.


PATATA
Peronospora (*Phytophthora infestans*): g. 250 per 100 litri di acqua (pari a 2,5 kg/ha).

Applicazioni in pieno campo a cadenza di 8-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare **SIDECAR M BLU** o altri prodotti: concorrenti **benalaxl-M** o fenilamidi per più di 3 volte su patata e pomodoro.

MODO DI UTILIZZO: questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

Reimballare	Introdurre	Attendere lo scioglimento	Aggiungere la sostanza
Intromettere con il	il numero di sacchetti	il numero dei sacchetti	te parte di acqua,
numero di sacchetti	idrosolubili, chiusi,	idrosolubili, chiusi,	necessaria alla corrol-
corrispondente alla dose	di impiego prevista.	di impiego prevista.	ta bagnatura della
di impiego prevista.	Mettere in funzione	Mettere in funzione	vegetazione.
Mettere in funzione	l'agitatore.	l'agitatore.	



Avvertenze d'uso: Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere e gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non riciclare i sacchetti con le mani nude.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI

Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Perciò lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

VIETI DI IMPIEGARE

DA NON IMPIEGARE IN SERRA: DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: il **SIDECAR M BLU** può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio.

Avvertenza: In caso di miscela con altri prodotti fitosanitari deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qui ora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospensione i trattamenti 42 giorni prima della raccolta per la vite e 14 giorni prima della raccolta per le altre colture.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

DA NON VENDERSI SPOSO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON OPERARE CONTRO VENTO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLLO DELLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

SIDECAR M BLU marchio registrato

SIDECAR® M BLU
FUNGICIDA COLORATO IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI
COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, POMODORO E PATATA
(IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)

COMPOSIZIONE

Benalaxl-M (Methyl-N-propylfenilcarbamato-N-2,6-dicloro-4-yl-D-alaninato)

pure g. 4

Mancozeb puro g. 65

Dispersanti, coloranti, bagnanti e supporti inerti (t.b. a g. 100

Frasi di rischio (R): Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede di dati di sicurezza.

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbiate D - ala 3 - Via Caldera, 21 -

20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sest. Qualità)

Registrazione Ministero della Salute n° del

DISTRIBUTORE: SIPCAM S.p.A. Via Sempione, 195 Pero (MI)

Officina di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavarella Po (RO) (sola formulazione);

Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); Agrifomula S.r.l. - Pagnanica (L'Aquila).

Quantità netta del preparato: 0,5/2 Sacchetti idrosolubili da 0,25) - 0,5/1 Sacchetti

idrosolubili da 0,5) - 1/4 Sacchetti idrosolubili da 0,25) - (2 Sacchetti idrosolubili

da 0,5) - (1 Sacchetti idrosolubili da 1) - 1/5/3 Sacchetti idrosolubili da 0,5) - 1/5/6

Sacchetti idrosolubili da 0,25) - 2/5/10 Sacchetti idrosolubili da 0,25) - 2/5/5 Sac-

chetti idrosolubili da 0,5) - 2/5/1 Sacchetti idrosolubili da 2,5) - 5/5 Sacchetti idro-

solubili da 1) - 5/10 Sacchetti idrosolubili da 0,5) - 5/2 Sacchetti idrosolubili da 2,5) -

8/8 Sacchetti idrosolubili da 1) - 8/4 Sacchetti idrosolubili da 2) - 10/5 Sacchetti i-

drisolubili da 2) - 10/4 Sacchetti idrosolubili da 2,5) - 10/20 Sacchetti idrosolubili da

0,5) - 13/10 Sacchetti idrosolubili da 1) Kg

Purifica N°

NORME PRECAUZIONALI: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Precauzioni particolari

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

Utilizzare guanti durante la miscelazione e il curio: utilizzare una stoffa, guanti e maschera filtrante con filtro di tipo FF P) di-

rettoria applicabile. Utilizzare dispositivi di protezione individuali (guanti, cannicia e pantaloni lunghi) per le lavorazioni di riciclo.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di: 10 metri per vite;

10 metri per pomodoro allevato con tunnel; 5 metri per pomodoro allevato a terra; 5 metri per patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

I fattori di assorbimento delle seguenti sostanze attive:

BENALAXL-M: 10% e MANCOZEB 65% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

BENALAXL-M: Stomatiti, in alcuni casi labiorrinite, dispnea e tosse.

MANCOZEB: Sintomi: cefalea, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato

respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatica, sensibilizzazione; SNC: ansia, cefalea, confusione,

depressione, ipotensione.

Il primo sintomo si verifica in caso di concomitanza o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito,

sudorazione, sete intensa, dolore precardiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipertensione arteriosa. Dopo qualche ora il

viso si iperemizza, diventa pallido e l'ipertensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Tempo di latenza: 30 minuti.

Avvertenza: Consultare un Centro Antidoti.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

SIDECAR M BLU è un preparato ad elevata attività antiparassitaria grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è

in grado di assicurare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida

PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie delle piante e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.

SIDECAR® M BLU

**FUNGICIDA COLORATO IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, POMODORO E PATATA
(IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)**

Registrazione Ministero della Salute n° n° del

COMPOSIZIONE

Benalaxil-M (Methyl-N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-D-alaninate)

puro g. 4

Mancozeb puro g. 65

Disperdenti, coloranti,

bagnanti e supporti inerti q.b. a g. 100

**IRRITANTE****PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE**

Contenuto del sacchetto: 250-500-1000-2000-2500 g

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 -
20153 MILANO - Tel. 02 4090111 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

Officina di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); AgriFormula S.r.l. - Paganica (L'Aquila).

**DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE
DA SCIogliere IN ACQUA SENZA ROMPERE**