

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 maggio 2006 (*GU n. 149 del 29-6-2006- Suppl. Ordinario n.157*)
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sirdate R».

IL DIRETTORE GENERALE

del dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 28 dicembre 2005 dall'impresa Isagro S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sirdate R» uguale al prodotto di riferimento denominato Galben R 4 33 Blu registrato al n. 5758, con decreto direttoriale in data 2 febbraio 1984 a nome dell'impresa medesima con sede in Milano;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Galben R 4 33 Blu dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Sirdate R» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data

di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Benalaxil e Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 (dieci) anni l'impresa Isagro S.p.a. con sede in Milano, via Caldera n. 21 e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato SIRDATE R con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg
0,2-0,25-0,4-0,5-0,6-0,7-0,75-0,8-0,9-
1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-7,5-8-9-10-12-14-15-20-25 anche in
sacchetti idrosolubili nelle taglie da: kg
0,5(5x0,1)-0,5(1x0,5)-0,5(2x0,25)-1(2x0,5)-
1(1x1)-1(4x0,25)-1(5x0,2)-1,5(6x0,25)-1,5(3x0,5)-2(5x0,4)-2,5(5x0,5)-
3(6x0,5)-3(3x1)-5(25x0,2)-5(2x2,5)-
5(5x1)-8(4x2)-10(10x1)-10(20x0,5)-10(5x2)-20(10x2).

Il prodotto in questione e' preparato anche in sacchetti idrosolubili presso gli stabilimenti delle imprese:

- Agriformula S.r.l. - Paganica (Aquila) autorizzato con decreti del 26 ottobre 1972/22 settembre 2004;

- Isagro S.p.a. - Adria Cavanella Po (Rovigo) autorizzato con decreti del 7 ottobre 1977/12 novembre 2004;

- Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13090.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 17 maggio 2006

Il direttore generale: Borrello

----> Vedere Allegato da pag. 77 a pag. 79 del S.O. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

POMODORO

Peronospora (*Phytophthora infestans*): g 400 - 600
Trattare ogni 12 - 14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione, nei trattamenti di disintra vete fungicidi di copertura.

PATATA

Peronospora (*Phytophthora infestans*): g 500 - 600

Efficace non più di 3 trattamenti: il primo al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione e gli altri distanziati di 14 giorni. Nei trattamenti successivi usare fungicidi di copertura, i quali possono essere impiegati anche sin dall'inizio, nei casi di minore pericolo dell'infezione. Non impiegare il prodotto come stratiante (ossia dopo la comparsa delle macchie) per il periodo dell'inserimento della resistenza.

CIPOLLA

Peronospora (*Peronospora destructor*): g 400 - 500

Trattare ogni 14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione. Per favorire l'attività del prodotto e consigliabile aggiungere alla sospensione fungicida un bagnante, es. PTOFIL 50 celi.

PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORI

(*Phytophthora*, *Peronospora*, *Brennia* e *Pyllosticta*)

Trattare ogni 15 - 20 giorni, in modo accurato la vegetazione, a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione.

MODO DI UTILIZZO: questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

Riempi l'irroratore nell'ammontare del numero di sacchetti idrosolubili, chiusi, corrispondente alla dose di impiego prevista. Mettere in funzione l'irroratore. Aggiungere la sostanza prima di acqua, necessariamente dalla vegetazione.

20-25% d'acqua.



Avvertenze d'uso: Nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI

Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Per lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti. **CONFERMATO:** il SIRDAT-E K può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. E' inibibile anche agli insetticidi (argomenti) e fertilizzanti fogliari (Liliani).

Avvertenze: il prodotto di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Quando si verificassero casi di intossicazione informare il medico della misurazione (compilata).

Fitosanitari: non si deve gettare durante la fioritura. Per le piante ornamentali e da fiori, in considerazione dell'elevato numero di specie e varietà, si consiglia di eseguire prove preliminari per saggiare la sensibilità.

Sospensione i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO



NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DAUZZE AGRICOLE ALLE STRADE.

SIRDAT-E Marchio registrato

SIRDAT-E

FUNGICIDA A POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DELLA PATATA, DEL POMODORO, DELLA CIPOLLA E DELLE COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORI

**IRRITANTE****PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

g. 4

g. 33

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

g. 100

SIRDATE R

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DELLA PATATA, DEL POMODORO, DELLA CIPOLLA E DELLE COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORI (SACCHETTI IDROSOLUBILI)

COMPOSIZIONE

Benalaxil puro g. 4

Rame metallico (sotto forma di ossicloruro) g. 33

Bagnanti, disperdenti,

coloranti e supporti inerti q.b. a g. 100


ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

Registrazione Ministero della Salute n° del

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO: 100 - 200 - 250 - 400 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 g

AVVERTENZA: leggere attentamente il testo dell'etichetta riportato sul contenitore.

**DA SCIOGLIERE IN ACQUA
SENZA ROMPERE**



IRRITANTE



**PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE**

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NOR MALE

VITE

Peronospora (*Plasmopora viticola*): g. 400 - 500
 Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli fiorali (7 - 8 foglie). I successivi trattamenti si eseguono ranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro concentrandone coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe. Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura

POMODORO

Peronospora (*Phytophthora infestans*): g. 500 - 600
 Trattare ogni 12 - 14 giorni dei verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione; nei trattamenti di chiusura usare fungicidi di copertura.

PATATA

Peronospora (*Phytophthora infestans*): g. 500 - 600

Effettuare non più di 3 trattamenti: il primo al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione e gli altri distanziati di 14 giorni. Nei trattamenti successivi usare fungicidi di copertura, i quali possono essere impiegati anche sin dall'inizio, nei casi di minore pericolo dell'infezione. Non impiegare il sistemico come eradicante (ossia dopo la comparsa delle macchie) per il pericolo dell'insorgenza della resistenza

CIPOLLA

Peronospora (*Peronospora destructor*): g. 400 - 500

Trattare ogni 14 giorni dei verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione. Per favorire l'attività del prodotto è consigliabile aggiungere alla sospensione fungicida un bagnante, es. FITO-FIL 50 cc/l.

PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORI: g. 600

(*Phytophthora*, *Peronospora*, *Bremia* e *Pyllosticta*)
 Trattare ogni 15 - 20 giorni irrorando accuratamente la vegetazione, a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione.

Preparazione della sospensione

Scomperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la seguente quantità di acqua, agitando sino ad ottenere la diluizione voluta.

COMPATIBILITA': Il SIRDATE R può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. E' miscelabile anche con biostimolanti (Eposim) e fertilizzanti (fogliari e radicali).

Avvertenze: Essendo un miscela con altri prodotti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Quotidiani si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitosensibilità: non si deve trattare durante la fioritura. Per le piante ornamentali e da fiori, in considerazione dell'elevato numero di specie e varietà, si consiglia di eseguire prove preliminari per saggiare la sensibilità.

Sospensione: i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dal suo improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Per la sua buona conservazione, il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e fresco.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO

NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RUTILIZZATO


NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE.

EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE D'ARRE.

AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

SIRDAT E Marchio registrato



SIRDATE R

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DELLA PATATA, DEL POMODORO, DELLA CIPOLLA E DELLE COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORI

COMPOSIZIONE

Benalacil puro g. 4
 Rame metallico (sotto forma di ossidato) g. 33
 Bagnanti, dispersanti, coloranti e supporti inerti g. 100

Frasi di rischio (R): Irritante per gli occhi. "Attenzione" tossico per gli organismi acquatici: può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni sulle quali si fonda il dati di sicurezza.


ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbro D - via 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sest. Qualità)

Registrazione Ministero della Salute n° del **DISTRIBUTTORE:** Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. Via Pontaccio, 10 - 20121 - Milano.

Officina di produzione: Agriformula S.r.l. - Paganica (L'Aquila); Isagro S.p.A. - Adria Cavanello Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

Quantità netta del preparato: 0,2 - 0,25 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7,5 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 kg

Partita N°



IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
 Trattamento di associazione della seguente sostanza attiva:
 Benalacil Azil 4% e RAME (sotto forma di ossidato) 33%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
 BENALACIL - Sintomi in animali da laboratorio: dispietico e torpore.
 RAME - Sintomi denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, ematomi. Venuta con emorragie di materiale di colore verde, brividi gastroenterici, diarrea ematica, vertigine addominali, ittero, ematomi, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritazione estrema ed oculare.

Con ogni Simulacra
 Avvertenza: consultare un Centro Antivenen

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
 Il SIRDATE R è un coformulato ad elevata attività antiperosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti parasitica una doppia difesa fungicida PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Rame attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Alternaria e Septoria