

## MINISTERO DELLA SALUTE

### **DECRETO 14 febbraio 2007 (GU n. 57 del 9-3-2007- Suppl. Ordinario n.64)**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Stadio M», registrato al n. 13544.**

IL DIRETTORE GENERALE  
della sicurezza degli alimenti  
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194, e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2006 dall'impresa Isagro S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Stadio M» uguale al prodotto di riferimento denominato «Fantic M Blu» registrato al n. 12870 con decreto direttoriale in data 28 settembre 2006 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Fantic M Blu» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Stadio M» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo

l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Benalaxil-M e Mancozeb;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 settembre 2009 l'impresa Isagro S.p.a., con sede in via Caldera, 21 - Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario «irritante pericoloso per l'ambiente» denominato STADIO M con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 0,2-0,25-0,5-1-5-10-20-25 noche in sacchetti idrosolubili nelle taglie da: 0,5(1x0,5) - 0,5(2x0,25) - 1(1x1) - 1(2x0,5) - 1(4x0,25) - 1,5(3x0,5) - 1,5(6x0,25) - 2,5(1x2,5) - 2,5(5x0,5) - 2,5(10x0,25) - 5(5x1) - 5(10x0,5) - 5(2x2,5) - 8(4x2) - 8(8x1) - 10(5x2) - 10(10x1) - 10(20x0,5) - 10(4x2,5) kg.

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Isagro S.p.a. Aprilia (Latina) autorizzato con decreti 31 ottobre 1974/16 aprile 2004;

Isagro S.p.a. - Adria Cavanella Po (Rovigo) autorizzato con decreti del 7 ottobre 1977/12 novembre 2004;

Agriformula S.r.l. - Paganica (L'Aquila) autorizzato con decreti del 26 ottobre 1972/22 settembre 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13544.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 14 febbraio 2007

Il direttore generale: Borrello

----> Vedere Allegato da pag. 115 a pag. 117 del S.O. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO**

STADIO M è un preparato ad elevata attività antiparassitaria, grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie delle piante e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.

La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale sui Escoriosi e Black-rot della vite.

**MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.****VITE**

Peronospora (*Plasmopara viticola*), g. 250 per 100 litri di acqua (pari a 2,5 kg/ha).

I trattamenti vanno eseguiti nel periodo compreso fra il verificarsi delle condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e la fase fenologica di sviluppo dei grappoli in cui gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe. I trattamenti vanno eseguiti ad un intervallo di 10-14 giorni. Il primo trattamento va eseguito in ogni caso non più tardi della fase fenologica di differenziazione degli organi fiorali (7-8 foglie). Successivamente allo svincolo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

Su questa coltura non effettuare più di 3 interventi nell'arco della stagione.

**POMODORO**

Peronospora (*Phytophthora infestans*), g. 250 per 100 litri di acqua (pari a 2,5 kg/ha)

Applicazioni in pieno campo a cadenza di 10 giorni a partire dai verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione

**PATATA**

Peronospora (*Phytophthora infestans*), g. 250 per 100 litri di acqua (pari a 2,5 kg/ha)

Applicazioni in pieno campo a cadenza di 8-10 giorni a partire dai verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare STADIO M o altri prodotti contenenti: benalaxil-M o fenilamidi, per più di 3 volte su patata e pomodoro.

**Preparazione della sospensione**

Temperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

**DIVETI D'IMPIEGO**

**DA NON IMPIEGARE IN SERRA, DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.**

**COMPATIBILITÀ:** il STADIO M può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio.

**Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta per la vite e 14 giorni prima delle raccolte per le altre colture.**

**ATTENZIONE:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON OPERARE CONTRO VENTO**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.**

**NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL**

**MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA**

**CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO**

**NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**STADIO M**

**FUNGICIDA COLORATO IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, POMODORO E PATATA**

**COMPOSIZIONE**

Benalaxil-M (Methyl-N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-D-alaninate)

può contenere..... g. 4

Mancozeb puro..... g. 65

Dispersidenti, coloranti, bagnanti e supporti inerti, q. b. a g. 100

**Frasi di rischio (R):** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. **Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.**

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabricato D - ala 3 - Via Caldera, 2 - 20124 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

Registrazione Ministero della Salute n° del



**DISTRIBUTORE:** Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. Via Pontaccio, 10 - 20121 - Milano.

OFFICINE DI PRODUZIONE: Isagro S.p.A. - Aprilia (LT), Isagro S.p.A. - Adria Cavandola Po (Rovigo), Agriformula S.r.l. - Paganica (L'Aquila).

**QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO:** 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25

Kg

Partita n°

**IRRITANTE****PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**NORME PRECAUZIONALI:** In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

**Precauzioni particolari**

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Utilizzare guanti durante la miscelazione e il carico; utilizzare tuta standard, guanti e maschera filtrante con filtro di tipo FF-P1 durante l'applicazione. Utilizzare dispositivi di protezione individuali (guanti, camicia e pantaloni lunghi) per le lavorazioni di rientro.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di: 10 metri per vite; 10 metri per pomodoro allevato con tutore; 5 metri per pomodoro allevato a terra; 5 metri per patata.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:**

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: BENALAXIL-M 4% e MANCOZEB 65%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

**BENALAXIL-M** - Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.

**MANCOZEB** - Sintomi: cure: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa,

sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatoforme,

sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflexia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta

con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigi-



ni, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotesione si ag-

grava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni

**STADIO M**  
**FUNGICIDA COLORATO IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, POMODORO E PATATA (IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)**

**COMPOSIZIONE**  
Benalaxil-M (Mebuhyl-N-phenylacetyl-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate) ..... g. 4  
Mancozeb puro ..... g. 65  
Dispendenti, coloranti e supporti inerti (a, b, c) ..... g. 100

**Frasi di rischio (R):** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrarli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

**ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbriano D. - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 469011 (centr.) - 02 40901276 (set. Qualità)**  
*Registrazione Ministero della Salute n° del DISTRIBUTORE:* Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. Via Pontaccio, 10 - 20121 - Milano.

Officina di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavarella Po (RO) (sola formulazione); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); Agriformula S.r.l. - Paganica (L'Aquila).

**Quantità netta del preparato:** 0,5(2) Sacchetti idrosolubili da 0,25) - 0,5(1) Sacchetti idrosolubili da 0,5) - 1(4) Sacchetti idrosolubili da 0,25) - 1(2) Sacchetti idrosolubili da 0,5) - 1(1) Sacchetti idrosolubili da 1) - 1,5(3) Sacchetti idrosolubili da 0,5) - 1,5(6) Sacchetti idrosolubili da 0,25) - 2,5(10) Sacchetti idrosolubili da 0,25) - 2,5(5) Sacchetti idrosolubili da 0,5) - 2,5(1) Sacchetti idrosolubili da 2,5) - 5(5) Sacchetti idrosolubili da 1) - 5(10) Sacchetti idrosolubili da 0,5) - 5(2) Sacchetti idrosolubili da 2,5) - 8(8) Sacchetti idrosolubili da 1) - 8(4) Sacchetti idrosolubili da 2) - 10(5) Sacchetti idrosolubili da 2) - 10(4) Sacchetti idrosolubili da 2,5) - 10(20) Sacchetti idrosolubili da 0,5) - 10(10) Sacchetti idrosolubili da 1) Kg

**Partita N°**

STADIO M è un preparato ad elevata attività antiparassitaria, grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza e in grado di assicurare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie delle piante e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.

La presenza di Mancozeb all'interno del prodotto assicura un effetto collaterale su Escarioni e Black-rot della vite.

**MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.**

**VITE**  
Peronospora (*Plasmopara viticola*): g. 250 per 100 litri di acqua (pari a 2,5 kg/ha).  
I trattamenti vanno eseguiti nel periodo compreso fra il verificarsi delle condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e la fase fenologica di sviluppo dei grappoli in cui gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe. I trattamenti vanno eseguiti ad un intervallo di 10-14 giorni. Il primo trattamento va eseguito in ogni caso non più tardi della fase fenologica di differenziazione degli organi fiorali (7-8 foglie). Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.  
Su questa coltura non effettuare più di 3 interventi nell'arco della stagione.

**POMODORO**  
Peronospora (*Phytophthora infestans*): g. 250 per 100 litri di acqua (pari a 2,5 kg/ha)  
Applicazioni in pieno campo a cadenza di 10 giorni a partire dai verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

**PATATA**  
Peronospora (*Phytophthora infestans*): g. 250 per 100 litri di acqua (pari a 2,5 kg/ha)  
Applicazioni in pieno campo a cadenza di 8-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione.

Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare STADIO M o altri prodotti contenenti benalaxil-M o fenilammati per più di 3 volte su una coltura e pomodoro.

**MODO DI UTILIZZO:** questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

Riempre l'aromatizzatore con il numero dei sacchetti idrosolubili corrispondente alla dose di impiego prevista. Mettere in funzione l'agitatore.

Introdurre l'aromatizzatore nel campo. Aggiungere la restante parte di acqua necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

Attenzione d'uso: Nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.

**ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI**  
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate in sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Perfino lo spalmamento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

**DIVIETI DI IMPIEGO**  
**DA NON IMPIEGARE IN SERRA, DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE**  
**COMPATIBILITÀ:** IL STADIO M può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci ammalinanti in commercio.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta per la vite e 14 giorni prima della raccolta per le altre colture.**

**ATTENZIONE:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle precauzioni e condizioni essenziali per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

**DA NON VENDERSI FUORI**  
**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**  
**NON OPERARE CONTRO VENTO**  
**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI BEVANDE O CORSI D'ACQUA**  
**NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PELARE IL MATERIALE**  
**D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE O SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE AT-**  
**TRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.**  
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**  
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**NORME PRECAUZIONALI:** In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

**Precauzioni particolari**  
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Utilizzare guanti durante la miscelazione e il carico; utilizzare tuta standard, guanti e mascherina filtrante con filtro di tipo FF-P1 durante l'applicazione. Utilizzare dispositivi di protezione individuali (guanti, camicia e pantaloni lunghi) per le lavorazioni di riporto. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non variata dai corpi idrici superficiali di: 10 metri per vite; 10 metri per pomodoro allevato con uva; 5 metri per pomodoro allevato a terra; 5 metri per patata.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:**  
Fruiti di associazione delle seguenti sostanze attive:  
BENALAXIL-M 4% e MANCOZEB 65%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:  
BENALAXIL-M - Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.  
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti; sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa; sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree; broncopatia asmatoforme; scarsa tolleranza; SNC: atassia, cecità; commozione depressiva; iperreflessia.  
Fruiti sincretici: si verifica in caso di concomitante o progressiva assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipertensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso, da pallorito diventa pallido e l'ipertensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.  
Temperatura: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antidote

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO**



**STADIO M**

**FUNGICIDA COLORATO IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, POMODORO E PATATA  
(IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)**

Registrazione Ministero della Salute n° n° del

**COMPOSIZIONE**


Benalaxil-M (Methyl-N-phenylacetyl-N-2,6-xylil-D-alaninate)

puro ..... g. 4


Mancozeb puro ..... g. 65

Disperdenti, coloranti,

bagnanti e supporti inerti ..... q.b. a g. .... 100



**IRRITANTE**



**PERICOLOSO PER  
L'AMBIENTE**

Contenuto del sacchetto: 250-500-1000-2000-2500 g

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

Officina di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); AgriFormula S.r.l. - Paganica (L'Aquila).

**DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE  
DA SCIogliere IN ACQUA SENZA ROMPERE**