MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 febbraio 2006 (*GU n. 64 del 17-3-2006*)
Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Trophy EC», registrato al n. 12917.

IL CAPO DIPARTIMENTO
per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione
e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (SO. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comnia 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 24 agosto 2005 dall'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. con sede legale in Lodi, via San Colombano n. 81/A, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Trophy EC, uguale al prodotto di riferimento denominato Bolero, contenente la sostanza attiva acetochlor, registrato a nome dell'impresa medesima al n. 12080, con decreto dirigenziale del 27 gennaio 2004, modificato con successivi decreti di cui l'ultimo del 17 gennaio 2006;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

- il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato Bolero;
- nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;
- l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Bolero;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 194;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 27 gennaio 2009 l'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.a., con sede legale in San Colombano n. 81/A - Lodi, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TROPHY EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva acetochlor in esso contenuta.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20-50-100-200.
Il prodotto in questione e' importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera Monsanto Agricultural Company - Antwerp (Belgio).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12917.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2006

Il capo dipartimento: Marabelli

----> Vedere da pag. 49 a pag. 50 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

TROPHY EC®

Erbicida selettivo per il mais
Formulazione concentrato emulsionabile

Composizione:

Acetochlor puro	g 76,8 (840 g/l)
Furilazole (antidoto agronomico)	g 2,5 (28 g/l)
Coformulanti	q. b. a g 100



Nocivo



Pericoloso per l'ambiente

Nocivo per inalazione e ingestione.
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via S.Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

Officina di produzione:
Monsanto Agricultural Company - ANTWERP (Belgio)
Registrazione del Ministero della Salute n. ... del ...

Distribuito da:
Dow AgroSciences Italia Srl
Via Patroclo, 21 – Milano

Quantità netta del preparato: litri 50 - 100 – 200

ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO: NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

Partita n°: vedere sulla confezione.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro antiveleni.

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Agisce sui semi in via di germinazione.

SPETTRO D'AZIONE
Erbe infestanti sensibili: *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Setaria spp.* (Pabbio), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Solanum nigrum* (Erba Morella), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Veronica spp.*(Veronica).
Erbe infestanti mediamente sensibili: *Poa spp.* (Fienarola), *Panicum miliaceum (panico coltivato)*, *Sorghum halepense* (da seme) (Sorghetta), *Chenopodium spp.* (Farinello), *Polygonum spp.(Poligono)*, *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Datura stramonium* (Stramonio), *Senecio vulgaris* (Erba Calderina), *Stellaria media* (Centocchio), *Artemisia sp.* (Artemisia), *Calystegia sepium* (Villuchio), *Cirsium arvensis* (Stoppione), *Rumex acetosella* (Romice acetosella).

EPOCHE DI IMPIEGO
TROPHY EC si può applicare in pre-semina, pre-emergenza o post-emergenza precoce (fino alla 3 - 4 foglia) del mais, ma prima dell'emergenza delle malerbe.
L'applicazione in pre-semina deve avvenire con un leggero interramento del prodotto (2 - 5 cm)

DOSI DI IMPIEGO
2 - 2,4 l/ha prima o subito dopo la semina del mais
1,5 - 2 l/ha con mais già emerso. Le dosi possono essere ridotte a 1,2/1,6 l/ha nei terreni non irrigui o con basso potenziale di infestazione e in miscela con erbicidi ad azione sinergica.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Distribuire impiegando 200 - 400 litri d'acqua per ettaro.
Utilizzare attrezzature operanti a bassa pressione e ugelli a ventaglio.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE ERBICIDA
Stemperare in poca acqua la quantità prestabilita di prodotto, mescolando con cura. Versare la sospensione nella metà dell'acqua necessaria, indi riempire la botte agitando, o versare direttamente la dose nel premiscelatore.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Nei trattamenti di pre-emergenza si consiglia di trattare appena dopo la semina quando il terreno è ancora umido. Una buona umidità del terreno favorisce l'attivazione del prodotto. Nelle primavere ventose e siccitose un'irrigazione a pioggia è consigliabile per garantire i migliori risultati.
Colture sostitutive. Nel caso di eventi meteorici o parassitari che richiedano la sostituzione della coltura nei primi stadi, si può riseminare mais o sorgo da granella o da foraggio, se la miscela comprende erbicidi a base di terbutilazina o isoxaflutolo. Se in miscela con pendimetalin tra le colture sostitutive si possono includere soia, patata, fagiolo, fagiolino.

MODALITÀ D'IMPIEGO
È preferibile usare TROPHY EC da solo o in miscela con prodotti a prevalente azione dicotileconicida per completarne lo spettro d'azione.

Divieto di impiego con attrezzature manuali

Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie con filtri combinati di tipo A – P

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

RISCHI DI NOCIVITÀ
Attenzione: il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiori a 15 metri.

COMPATIBILITÀ
TROPHY EC è miscibile con altri prodotti registrati per l'impiego su mais. Nel caso di nuovi formulati verificare la compatibilità prima dell'uso. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine. Dopo l'impiego e prima del loro riutilizzo lavare accuratamente la pompa e i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione del prodotto.
Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme e su mais dolce.
Conservare il prodotto protetto dal gelo.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non operare contro vento.

Contenitore previsto per l'uso con sistemi chiusi di travaso.
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori da 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

DA NON VENDERSI SFUSO

TROPHY EC®

Erbicida selettivo per il mais
Formulazione concentrato emulsionabile

Composizione:

Acetochlor puro	g 76,6	(840 g/l)
Furilazole (antidoto agronomico)	g 2,5	(28 g/l)
Coformulanti	q. b. a g 100	



Nocivo

Pericoloso per l'ambiente

Nocivo per inalazione e ingestione.
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via S.Colombano, 81/A - 26900 LODI (LO)

Officina di produzione:
Monsanto Agricultural Company - ANTWERP (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n. ... del ...

Distribuito da:
Dow AgroSciences Italia Srl
Via Patroclo, 21 – Milano

Quantità netta del preparato: litri 1 - 5 - 10 - 20

Partita n°: vedere sulla confezione.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro antiveleni.

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Agisce sui semi in via di germinazione.

SPETTRO D'AZIONE
Erbe infestanti sensibili: *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Setaria spp.* (Pabbio), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Solanum nigrum* (Erba Morella), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Veronica spp.*(Veronica).
Erbe infestanti mediamente sensibili: *Poa spp.* (Fienarola), *Panicum miliaceum (panico coltivato)*, *Sorghum halepense* (da seme) (Sorghetta), *Chenopodium spp.* (Farinello), *Polygonum spp.(Poligono)*, *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Datura stramonium* (Stramonio), *Senecio vulgaris* (Erba Calderina), *Stellaria media* (Centocchio), *Artemisia sp.* (Artemisia), *Calystegia sepium* (Villuchio), *Cirsium arvensis* (Stoppione), *Rumex acetosella* (Romice acetosella).

EPOCHE DI IMPIEGO

TROPHY EC si può applicare in pre-semina, pre-emergenza o post-emergenza precoce (fino alla 3 - 4 foglia) del mais, ma prima dell'emergenza delle malerbe.
L'applicazione in pre-semina deve avvenire con un leggero interramento del prodotto (2 - 5 cm).

DOSI DI IMPIEGO
2 - 2,4 l/ha prima o subito dopo la semina del mais
1,5 - 2 l/ha con mais già emerso. Le dosi possono essere ridotte a 1,2/1,6 l/ha nei terreni non irrigui o con basso potenziale di infestazione e in miscela con erbicidi ad azione sinergica.

VOLUME DI IRRORAZIONE
Distribuire impiegando 200 - 400 litri d'acqua per ettaro.
Utilizzare attrezzature operanti a bassa pressione e ugelli a ventaglio.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE ERBICIDA
Stemperare in poca acqua la quantità prestabilita di prodotto, mescolando con cura. Versare la sospensione nella metà dell'acqua necessaria, indi riempire la botte agitando, o versare direttamente la dose nel premiscelatore.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Nei trattamenti di pre-emergenza si consiglia di trattare appena dopo la semina quando il terreno è ancora umido. Una buona umidità del terreno favorisce l'attivazione del prodotto. Nelle primavere ventose e siccitose un'irrigazione a pioggia è consigliabile per garantire i migliori risultati.
Colture sostitutive. Nel caso di eventi meteorici o parassitari che richiedano la sostituzione della coltura nei primi stadi, si può riseminare mais o sorgo da granella o da foraggio, se la miscela comprende erbicidi a base di terbutilazina o isoxaflutolo. Se in miscela con pendimetalin tra le colture sostitutive si possono includere soia, patata, fagiolo, fagiolino.

MODALITÀ D'IMPIEGO
E' preferibile usare TROPHY EC in miscela con prodotti a prevalente azione dicotiledonicida per completarne lo spettro d'azione.

Divieto di impiego con attrezzature manuali

Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie con filtri combinati di tipo A - P

RISCHI DI NOCIVITÀ
Attenzione: il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 15 metri.

COMPATIBILITÀ
TROPHY EC è miscibile con altri prodotti registrati per l'impiego su mais. Nel caso di nuovi formulati verificare la compatibilità prima dell'uso. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine. Dopo l'impiego e prima del loro riutilizzo lavare accuratamente la pompa e i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione del prodotto.
Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme e mais dolce.
Conservare il prodotto protetto dal gelo.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non operare contro vento.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

DA NON VENDERSI SFUSO

06A02799