

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 luglio 2006 (GU n. 175 del 29-7-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Varadero 25 WG», registrato al n. 12123.

IL DIRETTORE GENERALE
per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione
e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale n. 216 del 5 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 3 marzo 2002 dall'impresa Emme Italia S.r.l. con sede legale in via Cesare Boldrini, 24 - Bologna diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Emme 01-04 ora denominato «Varadero 25 WGM»;

Visti gli atti da quali risulta che l'impresa Emme Italia S.r.l. ha ceduto la titolarita' del prodotto all'impresa Rocca Frutta S.r.l.;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Rimsulfuron;

Vista la nota dell'ufficio in data 17 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 13 dicembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

Scam S.r.l - Strada Bellaria, 164 - Modena;

Diachem S.p.a. - U.p. Sifa - Caravaggio (Bergamo);

Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena);
Eastsun Chemical Co - RM 4006, 1905 - Hongmei Road - Shanghai
(Cina);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di
anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli
ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di
registrazione, l'impresa Rocca Frutta S.r.l. con sede legale in via
Ravenna, 1114 Gaibana (Ferrara) e' autorizzata a porre in commercio
il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo
denominato «VARADERO 25 WG» con la composizione e alle condizioni
indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g
10-25-50-100-250-500 e Kg 1;

3. Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento
dell'impresa:

Scam S.r.l. - Strada Bellaria, 164 Modena, autorizzato con decreti
del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990 confezionato presso gli
stabilimenti dell'impresa:

Diachem S.p.a. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo), autorizzato
con decreti del 26 marzo 1987 e 7 giugno 2002;

Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena), autorizzato con decreti del
31 luglio 1975 e 23 settembre 2003 nonche' importate in confezioni
pronte per l'impiego e formulazione dallo stabilimento dell'impresa:

Eastsun Chemical Co - RM 4006, 1905 - Hongmei Road, Shanghai
(Cina);

4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12123;

5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto,
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio;

6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 15 a pag. 16 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

Etichetta / Foglietto illustrativo

Varadero 25 WG

Erbicida di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro
Granuli idrodispersibili

Partita n.:

Composizione:

Rimsulfuron puro..... g 25

Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di Prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disporre nell'ambiente. Ritornare alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. In caso di incidente o di malore, consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrare l'etichetta).



ROCCA FRUTTA s.p.a.
Via Roma, 111 - 41018 Salsomaggiore (BO)

Officine di produzione:

SCAM srl - Strada Bellaria, 164 - Modena

Eastsun Chemical Co - RM 4006, 1905 - Hongmei Road, Shanghai (Cina)

Officine di Confezionamento:

DIACHEM Spa - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo)

TORRE Srl - Torrenieri - Siena

Contenuto netto : g 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500; kg 1

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Interazione medica: Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Toxicità ambientale Avvertenza: Consultare un Centro Antidoti.

CARATTERISTICHE D'AZIONE

Il prodotto è un erbicida colifloreale che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5-10 giorni dall'applicazione. VARADERO 25 WG erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiché VARADERO 25 WG non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

Infestanti graminacee sensibili: *Avena spp* (*Avena sativa*), *Digitaria spp.* (*Sanguinella*), *Echinochloa spp.* (*Gliavone*), *Panicum dichotomiflorum* (*Panicum delle risaie*), *Panicum miliaceum* (*Panico coltivato*), *Phalaris spp.* (*Scagiolia*), *Setaria spp.* (*Panicastrofale*), *Sorghum bicolor* e *Sorghum halepense da seme e da rizoma* (*Sorghetto*).

Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti* (*Cenolo molle*), *Amaranthus spp.* (*Amaranto*), *Ambrosia spp.* (*Ambrosia*), *Atriplex majus* (*Visnaga maggiore*), *Bidens bipinnata* (*Forbicine*), *Capsella bursa-pastoris* (*Borsapastro*), *Convolvulus arvensis* (*Vilucchio*), *Calyptegia sepium* (*Vilucchio bianco*), *Diploaxis spp.* (*Rucole violacee*), *Fumaria officinalis* (*Fumera*), *Galin-soga parviflora* (*Galkingsoga*), *Hellanthus tuberosus* (*Topinambur*), *Metricaria chamomilla* (*Camomilla comune*), *Monarda arvensis* (*Menta campestre*), *Polygonum echinoides* (*Aspregina comune*), *Ranunculus spp.* (*Ranuncolo*), *Rapistrum rugosum* (*Miegro peloso*), *Sinapis arvensis* (*Senape selvatica*), *Sonchus spp.* (*Craspino*) e *Xanthium spp.* (*Nappola*).

EPOCA D'IMPIEGO: post-emergenza della coltura e delle infestanti

DOSE D'IMPIEGO:

- **Mais:** 50-60 g/ha addizionato con bagnante allo 0,2-0,3% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore è consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi del loro sviluppo; la dose maggiore è consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali già sviluppate e Digitaria. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (*Abutilon theophrasti*, *Ciperacee*, *Digitaria spp.*, ecc.) e in genere contro infestanti perennanti può essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarchianti alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. Non applicare VARADERO 25 WG sulla coltura precedentemente trattata con Forze, Terbufos, Isofetos, Paratol. In presenza di *Chenopodium spp.* (*Farinella*), *Datura stramonium* (*Stramonio comune*), *Polygonum spp.* (*Correggiola*) e *Solanum nigrum* (*Erba morella*) è consigliata la miscela con un prodotto ad attività dicotiledonocida efficace contro queste malerbe.
- **Pomodoro:** 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante allo 0,2% a partire dallo stadio cotiledonare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza di *Solanum nigrum* applicare 50 g/ha di VARADERO 25 WG + bagnante allo 0,2% entro e non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni in presenza di *Chenopodium spp.* (*farinella*), *Polygonum spp.* (*Correggiola*) e *Portulaca oleracea* (*Erba porcellana*) è opportuna la miscela con metribuzin 35% alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela può essere applicata, alle dosi più basse di metribuzin, a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di *Echinochloa spp.* (*Gliavone*) applicare 50-

80 g/ha di VARADERO 25 WG + bagnante allo 0,2%, effettuando, in caso di infestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di VARADERO 25 WG + bagnante allo 0,2% a distanza di 7-10 giorni.

- **Patata:** 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante allo 0,2% quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento può essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di VARADERO 25 WG + bagnante allo 0,2%.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 l/ha. Utilizzare ugelli a ventaglio e medio-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: VARADERO 25 WG, alla dose stabilita deve essere disciolto nell'irroratrice riempita circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere un bagnante nella quantità necessaria dopo aver inserito VARADERO 25 WG.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi parassitari o asfissia radicale.
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare VARADERO 25 WG. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con VARADERO 25 WG è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
 - 1) svuotare il serbatoio e risciacquare internamente; lavare il serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
 - 2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; aggiungere una soluzione detergente (0,5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
 - 3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2
 - 4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
 - 5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.

In caso di necessità di risemina nei terreni già precedentemente trattati con VARADERO 25 WG, ricorrere solo a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di VARADERO 25 WG non vi è limitazione alcuna per le colture in rotazione. Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione, possono compromettere l'attività erbicida.

NON IMPIEGARE IN SERRA

Compatibilità: Non miscelare VARADERO 25 WG con prodotti contenenti bentazone, 2,4-D, Cyanazina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di VARADERO 25 WG su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme. Non applicare su colture di patata destinate alla produzione di tuberi da "seme".

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 80 giorni prima della raccolta del mais.

Attenzione: da impiegare in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Varadero 25 WG

Erbicida di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro
Granuli idrodispersibili

Partita n.:**Composizione:**

Rimsulfuron puro..... g 25

Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di Prudenza : Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta);

**ROCCA FRUTTA - S.p.A.**

Via Ravenna, 1114 - 44040 Galbana (FE)

Officine di produzione :

SCAM srl - Strada Bellaria, 164 - Modena

Eastsun Chemical Co - RM 4006, 1905 - Hongmei Road, Shanghai (Cina)

Officine di Confezionamento:

DIACHEM Spa - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo)

TORRE Srl - Torrenieri - Siena

Contenuto netto : g 10 - 25 - 50 - 100**Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

06A07021